EQSJS

2016-2017

SANTÉ DES JEUNES DU SECONDAIRE

Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue

Alcool et drogues →

Élèves ayant eu au moins un épisode de consommation régulière d'alcool au cours de leur vie

DE QUOI EST-IL QUESTION ?

La consommation régulière d'alcool est définie par le fait de consommer au moins une fois par semaine, pendant une période d'au moins un mois, au moins une fois au cours de sa vie. La proportion est calculée par rapport aux élèves ayant consommé de l'alcool au cours des 12 mois précédant l'enquête.

Élèves ayant eu au moins un épisode de consommation régulière d'alcool (à vie)

Territoires	Élèves de 12 à 17 ans								
	Sexes réunis			Garçons			Filles		
	Nᵉ	%		Nᵉ	%		Nᵉ	%	
Abitibi-Témiscamingue	700	15	=	500	19	=	300	12	=
Québec	30 700	15		18 200	18		12 600	12	

Nᵉ Nombre estimé
= % régional comparable à celui du reste du Québec (l'écart entre les deux résultats n'est pas significatif)

Notes

Dans le tableau précédent, la comparaison des données (représentée par le symbole =) est effectuée entre le pourcentage régional et celui du reste du Québec, c'est-à-dire l'ensemble du Québec excluant la région. Néanmoins, les données « Québec » présentées dans ce tableau se rapportent bien à l'ensemble du Québec, qui inclut la région.

Le total peut différer de la somme des parties en raison de l'arrondissement des estimations.

FAITS SAILLANTS

En Abitibi-Témiscamingue, parmi les élèves ayant consommé de l'alcool au cours des 12 mois précédents, 15 % ont connu au moins un épisode de consommation régulière d'alcool au cours de leur vie. Les garçons étaient plus nombreux que les filles à rapporter un tel épisode, 19 % contre 12 %. Dans tous les cas, les données régionales sont comparables à celles du reste du Québec.

Évolution dans le temps



Pourcentage significativement plus faible qu'en 2010-2011

Faits saillants

De 2010-2011 à 2016-2017, on note aucun écart significatif dans la région en ce qui concerne la proportion d'élèves ayant eu au moins un épisode de consommation régulière d'alcool au cours de leur vie, les résultats des deux enquêtes étant comparables sur le plan statistique. Par contre, au Québec, on observe une baisse de la proportion durant la même période.

Qu'est-ce qui influence les résultats ?

La santé d'un individu est influencée par de nombreux facteurs. L'EQSJS permet de dégager des caractéristiques liées à diverses problématiques ou comportements chez les jeunes. Dans le tableau suivant, la flèche (↑) indique que le pourcentage d'élèves est plus élevé parmi ceux présentant la caractéristique mentionnée. Exemple : les élèves fumant la cigarette (premier facteur dans la liste) sont proportionnellement plus nombreux que les non-fumeurs à avoir consommé de l'alcool au moins une fois dans les 12 mois précédents. Cela ne signifie pas que le tabagisme entraîne la consommation d'alcool chez les jeunes mais qu'il existe une association statistique entre les deux. On peut aussi constater la présence d'une association entre le tabagisme et la consommation excessive d'alcool ou encore l'opinion selon laquelle il est facile de se procurer de l'alcool dans un délai de 24 heures. Les autres indicateurs sur l'alcool font également l'objet d'une fiche qu'il est possible de consulter.

	Indicateurs sur l'alcool			
Facteurs qui influencent les indicateurs sur l'alcool	Consommation d'alcool (12 mois)	Consommation régulière	Consommation excessive	Facile de se procurer de l'alcool
Fumant la cigarette	↑		↑	↑
Ayant consommé des drogues au cours des 12 mois précédents	↑		↑	↑
Ayant déjà eu une relation sexuelle consensuelle au cours de leur vie		↑		
Étudiant au 2e cycle (secondaire 3, 4 et 5)	↑	↑	↑	↑
Ayant un risque élevé de décrochage scolaire	↑		↑	↑
Ayant un faible soutien social dans leur famille	↑		↑	↑
Ayant un faible niveau de supervision parentale			↑	↑
Ayant manifesté une conduite imprudente ou rebelle au cours des 12 mois précédents				↑
Ayant manifesté une conduite délinquante au cours des 12 mois précédents				↑
Ayant infligé et subi de la violence lors de leurs relations amoureuses			↑	
Ayant manifesté au moins un comportement d'agressivité indirecte			↑	
Ayant manifesté au moins un comportement d'agressivité directe			↑	
Ayant un niveau élevé de détresse psychologique	↑		↑	↑

Source :

Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS), 2016-2017
Rapport provincial : http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/enfants-ados/alimentation/sante-jeunes-secondaire-2016-2017-t3.html

Questions ou commentaires ?

Guillaume Beaulé, Direction de santé publique
Courriel : guillaume_beaule@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 819 764-3264, poste 49211