



2016-2017

SANTÉ DES JEUNES DU SECONDAIRE

Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue

Alcool et drogues →

Élèves ayant présenté une consommation excessive d'alcool au cours des 12 mois précédents

DE QUOI EST-IL QUESTION ?

La consommation excessive d'alcool fait référence à la consommation de cinq verres ou plus lors d'une même occasion, au moins une fois au cours des douze mois précédant l'enquête.

Élèves ayant présenté une consommation excessive d'alcool (12 mois précédents)

Élèves de 12 à 17 ans

| Territoires | Sexes réunis | | Garçons | | Filles | |
|-----------------------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|
| | N ^e | % | N ^e | % | N ^e | % |
| Abitibi-Témiscamingue | 3 500 | 49 ↑ | 1 800 | 49 ↑ | 1 700 | 49 ↑ |
| Québec | 133 600 | 34 | 67 700 | 34 | 65 900 | 34 |

N^e

Nombre estimé



% régional plus élevé que celui du reste du Québec

Notes

Dans le tableau précédent, la comparaison des données (représentée par le symbole ↑) est effectuée entre le pourcentage régional et celui du reste du Québec, c'est-à-dire l'ensemble du Québec excluant la région. Néanmoins, les données « Québec » présentées dans ce tableau se rapportent bien à l'ensemble du Québec, qui inclut la région.

Le total peut différer de la somme des parties en raison de l'arrondissement des estimations.

FAITS SAILLANTS


En Abitibi-Témiscamingue, relativement plus d'élèves que dans le reste du Québec ont eu une consommation excessive d'alcool au moins une fois dans les 12 mois précédents l'enquête, soit 49 % contre 34 %. Ici, il n'y a pas de différence en fonction du sexe.

Dans la région, parmi les élèves ayant consommé de l'alcool au moins une fois dans les 12 mois précédents (données non illustrées) :

- 50 % ont eu une consommation excessive de 1 à 4 reprises (c'est plus qu'au Québec où la proportion est de 46 %) ;
- 15 % l'ont fait de 5 à 10 reprises (c'est plus qu'au Québec où la proportion est de 11 %) ;
- 10 % l'ont fait à 11 reprises ou plus (c'est plus qu'au Québec où la proportion est de 8 %) ;
- 25 % n'ont pas présenté de consommation excessive d'alcool (c'est moindre qu'au Québec (35 %)).

Évolution dans le temps

Proportion (%) d'élèves ayant présenté une consommation excessive d'alcool au cours des 12 mois précédents, Abitibi-Témiscamingue et Québec, 2010-2011 et 2016-2017



↓ Pourcentage significativement plus faible qu'en 2010-2011

Faits saillants

La proportion d'élèves ayant présenté une consommation excessive d'alcool au cours des 12 mois précédents est demeurée stable dans la région de 2010-2011 à 2016-2017, l'écart de 2 points n'étant pas significatif. Par contre, durant la même période au Québec, elle a diminué de 41 % à 34 %.

Qu'est-ce qui influence les résultats ?



La santé d'un individu est influencée par de nombreux facteurs. L'EQSJS permet de dégager des caractéristiques liées à diverses problématiques ou comportements chez les jeunes. Dans le tableau suivant, la flèche (↑) indique que le pourcentage d'élèves est plus élevé parmi ceux présentant la caractéristique mentionnée. Exemple : les élèves fumant la cigarette (premier facteur dans la liste) sont proportionnellement plus nombreux que les non-fumeurs à avoir eu une consommation excessive d'alcool dans les 12 mois précédents. Cela ne signifie pas que le tabagisme entraîne la consommation excessive d'alcool chez les jeunes mais qu'il existe une association statistique entre les deux. On peut aussi constater la présence d'une association entre le tabagisme et la consommation d'alcool (12 mois) ou encore l'opinion selon laquelle il est facile de se procurer de l'alcool dans un délai de 24 heures. Les autres indicateurs sur l'alcool font également l'objet d'une fiche qu'il est possible de consulter.

Indicateurs sur l'alcool

Facteurs qui influencent les indicateurs sur l'alcool

| | Consommation d'alcool (12 mois) | Consommation régulière | Consommation excessive | Facile de se procurer de l'alcool |
|--|---------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Fumant la cigarette | ↑ | | ↑ | ↑ |
| Ayant consommé des drogues au cours des 12 mois précédents | ↑ | | ↑ | ↑ |
| Ayant déjà eu une relation sexuelle consensuelle au cours de leur vie | | ↑ | | |
| Étudiant au 2e cycle (secondaire 3, 4 et 5) | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| Ayant un risque élevé de décrochage scolaire | ↑ | | ↑ | ↑ |
| Ayant un faible soutien social dans leur famille | ↑ | | ↑ | ↑ |
| Ayant un faible niveau de supervision parentale | | | ↑ | ↑ |
| Ayant manifesté une conduite imprudente ou rebelle au cours des 12 mois précédents | | | | ↑ |
| Ayant manifesté une conduite délinquante au cours des 12 mois précédents | | | | ↑ |
| Ayant infligé et subi de la violence lors de leurs relations amoureuses | | | ↑ | |
| Ayant manifesté au moins un comportement d'agressivité indirecte | | | ↑ | |
| Ayant manifesté au moins un comportement d'agressivité directe | | | ↑ | |
| Ayant un niveau élevé de détresse psychologique | ↑ | | ↑ | ↑ |

Source :

Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS), 2016-2017
 Rapport provincial : <http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/enfants-ados/alimentation/sante-jeunes-secondaire-2016-2017-t3.html>

Questions ou commentaires ?



Courriel :

Téléphone :

Guillaume Beaulé, Direction de santé publique

guillaume_beaule@ssss.gouv.qc.ca

819 764-3264, poste 49211