



2016-2017

SANTÉ DES JEUNES DU SECONDAIRE

Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue

Alcool et drogues →

Élèves ayant eu au moins un épisode de consommation régulière de drogues au cours de leur vie

DE QUOI EST-IL QUESTION ?

La consommation régulière de drogues est définie par le fait d'en consommer au moins une fois par semaine, pendant une période d'au moins un mois, au moins une fois au cours de sa vie. La proportion est calculée par rapport aux élèves ayant consommé de la drogue au cours de leur vie.

Élèves ayant eu au moins un épisode de consommation régulière de drogues (à vie)

Élèves de 12 à 17 ans

Territoires	Sexes réunis		Garçons		Filles	
	N ^e	%	N ^e	%	N ^e	%
Abitibi-Témiscamingue	800	42 =	400	43 =	300	40 =
Québec	29 700	39	16 600	41	12 900	36

N^e Nombre estimé

= % régional comparable à celui du reste du Québec (l'écart entre les deux résultats n'est pas significatif)

Notes

Dans le tableau précédent, la comparaison des données (représentée par le symbole =) est effectuée entre le pourcentage régional et celui du reste du Québec, c'est-à-dire l'ensemble du Québec excluant la région. Néanmoins, les données « Québec » présentées dans ce tableau se rapportent bien à l'ensemble du Québec, qui inclut la région.


Le total peut différer de la somme des parties en raison de l'arrondissement des estimations.

FAITS SAILLANTS

En Abitibi-Témiscamingue, parmi les élèves ayant consommé de la drogue au cours de leur vie, 42 % ont connu au moins un épisode de consommation régulière de drogues. Il s'agit d'un résultat comparable à celui du reste du Québec (39 %). On n'observe pas ici de différence entre les garçons et les filles.

Évolution dans le temps

Proportion (%) d'élèves ayant eu au moins un épisode de consommation régulière de drogues au cours de leur vie, Abitibi-Témiscamingue et Québec, 2010-2011 et 2016-2017



↓ Pourcentage significativement plus faible qu'en 2010-2011

Faits saillants

La proportion d'élèves ayant eu au moins un épisode de consommation régulière de drogues au cours de leur vie est demeurée relativement stable dans la région depuis 2010-2011, où elle se situait à 44 %. Au Québec, durant la même période, on a observé une baisse de la proportion, de 43 % à 39 %.

Qu'est-ce qui influence les résultats ?



La santé d'un individu est influencée par de nombreux facteurs. L'EQSJS permet de dégager des caractéristiques liées à diverses problématiques ou comportements chez les jeunes. Dans le tableau suivant, la flèche (↑) indique que le pourcentage d'élèves est plus élevé parmi ceux présentant la caractéristique mentionnée. Exemple : les élèves fumant la cigarette (premier facteur dans la liste) sont proportionnellement plus nombreux que les non-fumeurs à avoir consommé de la drogue au moins une fois dans les 12 mois précédents. Cela ne signifie pas que le tabagisme entraîne la consommation de drogue chez les jeunes mais qu'il existe une association statistique entre les deux. On peut aussi constater la présence d'une association entre le tabagisme et la consommation régulière de drogue ou encore l'opinion selon laquelle il est facile de se procurer du cannabis dans un délai de 24 heures. Les autres indicateurs sur les drogues font également l'objet d'une fiche qu'il est possible de consulter.

Indicateurs sur les drogues

Facteurs qui influencent les indicateurs sur les drogues

	Consommation de drogues (12 mois)	Consommation régulière	Facile de se procurer du cannabis
Fumant la cigarette	↑	↑	↑
Ayant consommé de l'alcool au cours des 12 mois précédents	↑		↑
Ayant déjà eu une relation sexuelle consensuelle au cours de leur vie	↑	↑	
Ayant occupé un emploi durant l'année scolaire	↑		
Étudiant au 2e cycle (secondaire 3, 4 et 5)	↑		↑
Ayant un risque élevé de décrochage scolaire	↑	↑	↑
Vivant dans une famille reconstituée ou monoparentale	↑	↑	↑
Dont les parents n'ont pas de diplôme d'études secondaires	↑		↑
Ayant un faible soutien social dans leur famille	↑		
Ayant un faible niveau de supervision parentale	↑		
Ayant manifesté une conduite imprudente ou rebelle au cours des 12 mois précédents	↑	↑	↑
Ayant manifesté une conduite délinquante au cours des 12 mois précédents	↑	↑	↑
Ayant un niveau élevé de détresse psychologique	↑	↑	↑
Ayant un faible niveau sur l'échelle d'estime de soi	↑	↑	

Source :

Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS), 2016-2017
 Rapport provincial : <http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/enfants-ados/alimentation/sante-jeunes-secondaire-2016-2017-t3.html>

Questions ou commentaires ?



Courriel :
Téléphone :

Guillaume Beaulé, Direction de santé publique
 guillaume_beaulé@ssss.gouv.qc.ca
 819 764-3264, poste 49211