



2016-2017

SANTÉ DES JEUNES DU SECONDAIRE

Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue

Alcool et drogues →

Élèves pensant qu'il est facile de se procurer
de l'alcool en 24 heures

DE QUOI EST-IL QUESTION ?

L'accessibilité à l'alcool est un facteur déterminant de sa consommation et des méfaits associés à celle-ci. Pour les personnes mineures, l'obtention d'alcool sans échange se produit lorsque quelqu'un offre ou achète de l'alcool sans compensation. L'obtention d'alcool avec échange se fait soit en donnant de l'argent à la personne qui fournit l'alcool, soit en lui offrant en échange une autre substance. D'autres manières pour obtenir de l'alcool incluent : demander à un étranger au magasin, acheter l'alcool directement au magasin (avec ou sans une carte d'identité frauduleuse), utiliser les réserves parentales avec ou sans permission ou voler des bouteilles.

Élèves pensant qu'il est facile de se procurer de l'alcool en 24 heures

Élèves de 12 à 17 ans

| Territoires | Sexes réunis | | Garçons | | Filles | |
|-----------------------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|
| | N ^e | % | N ^e | % | N ^e | % |
| Abitibi-Témiscamingue | 3 700 | 52 ↑ | 2 000 | 55 ↑ | 1 700 | 49 ↑ |
| Québec | 174 500 | 46 | 93 800 | 48 | 80 700 | 43 |

N^e Nombre estimé


↑ % régional plus élevé que celui du reste du Québec

Notes

Dans le tableau précédent, la comparaison des données (représentée par le symbole ↑) est effectuée entre le pourcentage régional et celui du reste du Québec, c'est-à-dire l'ensemble du Québec excluant la région. Néanmoins, les données « Québec » présentées dans ce tableau se rapportent bien à l'ensemble du Québec, qui inclut la région.


Le total peut différer de la somme des parties en raison de l'arrondissement des estimations.

FAITS SAILLANTS



En Abitibi-Témiscamingue, la moitié (52 %) des élèves pensaient qu'il était facile de se procurer de l'alcool en 24 heures, une proportion supérieure à celle dans le reste du Québec (46 %). Les garçons (55 %) étaient plus nombreux que les filles (49 %) à entretenir une telle opinion.

Évolution dans le temps



Comme il s'agit d'un nouvel indicateur en 2016-2017, aucune comparaison n'est possible avec l'enquête réalisée en 2010-2011.

Qu'est-ce qui influence les résultats ?



La santé d'un individu est influencée par de nombreux facteurs. L'EQSJS permet de dégager des caractéristiques liées à diverses problématiques ou comportements chez les jeunes. Dans le tableau suivant, la flèche (↑) indique que le pourcentage d'élèves est plus élevé parmi ceux présentant la caractéristique mentionnée. Exemple : les élèves fumant la cigarette (premier facteur dans la liste) sont proportionnellement plus nombreux que les non-fumeurs à avoir consommé de l'alcool au moins une fois dans les 12 mois précédents. Cela ne signifie pas que le tabagisme entraîne la consommation d'alcool chez les jeunes mais qu'il existe une association statistique entre les deux. On peut aussi constater la présence d'une association entre le tabagisme et la consommation excessive d'alcool ou encore l'opinion selon laquelle il est facile de se procurer de l'alcool dans un délai de 24 heures. Les autres indicateurs sur l'alcool font également l'objet d'une fiche qu'il est possible de consulter.

Indicateurs sur l'alcool

Facteurs qui influencent les indicateurs sur l'alcool

| | Consommation d'alcool (12 mois) | Consommation régulière | Consommation excessive | Facile de se procurer de l'alcool |
|--|---------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Fumant la cigarette | ↑ | | ↑ | ↑ |
| Ayant consommé des drogues au cours des 12 mois précédents | ↑ | | ↑ | ↑ |
| Ayant déjà eu une relation sexuelle consensuelle au cours de leur vie | | ↑ | | |
| Étudiant au 2e cycle (secondaire 3, 4 et 5) | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| Ayant un risque élevé de décrochage scolaire | ↑ | | ↑ | ↑ |
| Ayant un faible soutien social dans leur famille | ↑ | | ↑ | ↑ |
| Ayant un faible niveau de supervision parentale | | | ↑ | ↑ |
| Ayant manifesté une conduite imprudente ou rebelle au cours des 12 mois précédents | | | | ↑ |
| Ayant manifesté une conduite délinquante au cours des 12 mois précédents | | | | ↑ |
| Ayant infligé et subi de la violence lors de leurs relations amoureuses | | | ↑ | |
| Ayant manifesté au moins un comportement d'agressivité indirecte | | | ↑ | |
| Ayant manifesté au moins un comportement d'agressivité directe | | | ↑ | |
| Ayant un niveau élevé de détresse psychologique | ↑ | | ↑ | ↑ |

Source :

Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS), 2016-2017
 Rapport provincial : <http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/enfants-ados/alimentation/sante-jeunes-secondaire-2016-2017-t3.html>

Questions ou commentaires ?



Courriel :

Téléphone :

Guillaume Beaulé, Direction de santé publique

guillaume_beaule@ssss.gouv.qc.ca

819 764-3264, poste 49211