



SANTÉ DES JEUNES DU SECONDAIRE

2022-2023

Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue

Alcool et drogues →

Élèves ayant consommé de l'alcool au moins
une fois au cours des 12 mois précédents

DE QUOI EST-IL QUESTION ?

Les notions de « verre » ou de « consommation » font référence à l'information suivante : un verre de vin correspond à un volume de 120 à 150 ml ; une petite bière à un volume de 341 ml ; un verre de boisson forte ou un verre de « shooter » à un volume de 30 à 40 ml. La bière ayant 0,5 % d'alcool n'était pas considérée comme une consommation d'alcool.

Élèves ayant consommé de l'alcool au moins une fois (12 mois précédents)

Élèves de 12 à 17 ans

Territoires	Sexes réunis		Garçons		Filles	
	N ^e	%	N ^e	%	N ^e	%
Abitibi-Témiscamingue	5 000	63 ↑	2 500	61 ↑	2 600	66 ↑
Québec	210 200	47	100 900	44	109 300	50

N^e Nombre estimé

↑ % régional plus élevé que celui du reste du Québec

Notes

Dans le tableau précédent, la comparaison des données (représentée par le symbole ↑) est effectuée entre le pourcentage régional et celui du reste du Québec, c'est-à-dire l'ensemble du Québec excluant la région. Néanmoins, les données « Québec » présentées dans ce tableau se rapportent bien à l'ensemble du Québec, qui inclut la région.


Le total peut différer de la somme des parties en raison de l'arrondissement des estimations.

FAITS SAILLANTS

Dans la région, près des deux tiers (63 %) des élèves ont consommé de l'alcool au moins une fois dans les 12 mois précédents l'enquête, un résultat beaucoup plus élevé que dans le reste de la province (47 %). Plus de filles (66 %) que de garçons (61 %) se trouvaient dans cette situation.

En ce qui concerne l'âge d'initiation à la consommation d'alcool (données non illustrées), 11 % des élèves du secondaire de la région ont bu de l'alcool pour la première fois avant l'âge de 12 ans. Il s'agit d'un pourcentage supérieur à celui du reste du Québec (9 %). De plus, ce pourcentage régional a augmenté en comparaison avec celui obtenu en 2016-2017 (7 %) ; il revient ainsi aux valeurs observées en 2010-2011. En 2022-2023, autant de garçons (11 %) que de filles (10 %) dans la région avaient expérimenté l'alcool avant l'âge de 12 ans.

Répartition (%) des élèves ayant consommé au moins une fois de l'alcool au cours des 12 mois précédents, selon la fréquence, Abitibi-Témiscamingue et Québec, 2022-2023



↑ Pourcentage significativement plus élevé que celui du reste du Québec


↓ Pourcentage significativement plus faible que celui du reste du Québec

** Estimation de faible qualité, diffusée à titre indicatif seulement

Si dans l'ensemble, près des deux tiers des élèves ont consommé de l'alcool au moins une fois au cours des 12 mois précédents, 66 % de ceux-ci étaient des buveurs occasionnels (une fois par mois ou moins), 13 % ont consommé une seule fois, pour essayer, et moins du quart ont eu une consommation qualifiée de régulière (1 à 2 fois par semaine ou chaque jour). En comparaison avec les résultats de 2010-2011 et ceux de 2016-2017, on observe un portrait relativement stable pour chaque fréquence de consommation, les résultats étant statistiquement comparables.

Évolution dans le temps

Proportion (%) d'élèves ayant consommé de l'alcool au moins une fois au cours des 12 mois précédents, Abitibi-Témiscamingue et Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023



↓ Pourcentage significativement plus faible que celui du cycle précédent

Faits saillants

En 2022-2023, la proportion d'élèves ayant consommé de l'alcool au moins une fois au cours des 12 mois précédents est demeurée relativement stable dans la région, par rapport à 2016-2017. Elle avait diminué significativement de 2010-2011 à 2016-2017. Au Québec, on note deux baisses consécutives de la proportion entre 2010-2011 et 2022-2023.

Qu'est-ce qui influence les résultats ?



La santé d'un individu est influencée par de nombreux facteurs. L'EQSJS permet de dégager des caractéristiques liées à diverses problématiques ou comportements chez les jeunes. Dans le tableau suivant, la flèche (↑) indique que le pourcentage d'élèves est plus élevé parmi ceux présentant la caractéristique mentionnée. Exemple : les élèves fumant la cigarette (premier facteur dans la liste) sont proportionnellement plus nombreux que les non-fumeurs à avoir consommé de l'alcool au moins une fois dans les 12 mois précédents. Cela ne signifie pas que le tabagisme entraîne la consommation d'alcool chez les jeunes mais qu'il existe une association statistique entre les deux. On peut aussi constater la présence d'une association entre le tabagisme et la consommation excessive d'alcool. Les autres indicateurs sur l'alcool font également l'objet d'une fiche qu'il est possible de consulter.

Indicateurs sur l'alcool

Facteurs qui influencent les indicateurs sur l'alcool

	Consommation d'alcool (12 mois)	Consommation régulière	Consommation excessive
Fumant la cigarette	↑		↑
Ayant consommé des drogues au cours des 12 mois précédents	↑		↑
Ayant déjà eu une relation sexuelle consensuelle au cours de leur vie		↑	
Étudiant au 2e cycle (secondaire 3, 4 et 5)	↑	↑	↑
Ayant un risque élevé de décrochage scolaire	↑		↑
Ayant un faible soutien social dans leur famille	↑		↑
Ayant un faible niveau de supervision parentale			↑
Ayant infligé et subi de la violence lors de leurs relations amoureuses			↑
Ayant manifesté au moins un comportement d'agressivité directe			↑
Ayant un niveau élevé de détresse psychologique	↑		↑

Source :

Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS), 2022-2023
 Rapport provincial : <https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/enquete-quebecoise-sante-jeunes-secondaire-2022-2023.pdf>

Questions ou commentaires ?



Courriel :
Téléphone :

Guillaume Beaulé, Direction de santé publique
 guillaume_beaulé@ssss.gouv.qc.ca
 819 764-3264, poste 49211