



2022-2023

SANTÉ DES JEUNES DU SECONDAIRE

Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue

Alcool et drogues →

Élèves ayant présenté une consommation excessive d'alcool au cours des 12 mois précédents

DE QUOI EST-IL QUESTION ?

La consommation excessive d'alcool fait référence à la consommation de cinq verres ou plus lors d'une même occasion, au moins une fois au cours des douze mois précédant l'enquête.

Élèves ayant présenté une consommation excessive d'alcool (12 mois précédents)

Élèves de 12 à 17 ans

Territoires	Sexes réunis		Garçons		Filles	
	N ^e	%	N ^e	%	N ^e	%
Abitibi-Témiscamingue	3 700	47 ↑	1 900	46 ↑	1 800	47 ↑
Québec	133 400	29	64 100	28	69 300	32

N^e Nombre estimé

↑ % régional plus élevé que celui du reste du Québec

Notes

Dans le tableau précédent, la comparaison des données (représentée par le symbole ↑) est effectuée entre le pourcentage régional et celui du reste du Québec, c'est-à-dire l'ensemble du Québec excluant la région. Néanmoins, les données « Québec » présentées dans ce tableau se rapportent bien à l'ensemble du Québec, qui inclut la région.

Le total peut différer de la somme des parties en raison de l'arrondissement des estimations.

FAITS SAILLANTS


En Abitibi-Témiscamingue, relativement plus d'élèves que dans le reste du Québec ont eu une consommation excessive d'alcool au moins une fois dans les 12 mois précédents l'enquête, soit 47 % contre 29 %. Ici, il n'y a pas de différence en fonction du sexe.

Dans la région, parmi les élèves ayant consommé de l'alcool au moins une fois dans les 12 mois précédents (données non illustrées) :

- 48 % ont eu une consommation excessive de 1 à 4 reprises (c'est plus qu'au Québec où la proportion est de 43 %) ;
- 14 % l'ont fait de 5 à 10 reprises (c'est plus qu'au Québec où la proportion est de 11 %) ;
- 12 % l'ont fait à 11 reprises ou plus (c'est plus qu'au Québec où la proportion est de 9 %) ;
- 26 % n'ont pas présenté de consommation excessive d'alcool (c'est moindre qu'au Québec (37 %)).

Évolution dans le temps

Proportion (%) d'élèves ayant présenté une consommation excessive d'alcool au cours des 12 mois précédents, Abitibi-Témiscamingue et Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023



- ↓ Pourcentage significativement plus faible que celui du cycle précédent
- ↓ Pourcentage significativement plus faible que celui de 2010-2011

Faits saillants

La proportion d'élèves ayant présenté une consommation excessive d'alcool au cours des 12 mois précédents a diminué significativement dans la région de 2010-2011 à 2022-2023, passant de 51 % à 47 %. Au Québec, durant la même période, la proportion a connu deux baisses significatives consécutives.

Qu'est-ce qui influence les résultats ?



La santé d'un individu est influencée par de nombreux facteurs. L'EQSJS permet de dégager des caractéristiques liées à diverses problématiques ou comportements chez les jeunes. Dans le tableau suivant, la flèche (↑) indique que le pourcentage d'élèves est plus élevé parmi ceux présentant la caractéristique mentionnée. Exemple : les élèves fumant la cigarette (premier facteur dans la liste) sont proportionnellement plus nombreux que les non-fumeurs à avoir consommé de l'alcool au moins une fois dans les 12 mois précédents. Cela ne signifie pas que le tabagisme entraîne la consommation d'alcool chez les jeunes mais qu'il existe une association statistique entre les deux. On peut aussi constater la présence d'une association entre le tabagisme et la consommation excessive d'alcool. Les autres indicateurs sur l'alcool font également l'objet d'une fiche qu'il est possible de consulter.

Indicateurs sur l'alcool

Facteurs qui influencent les indicateurs sur l'alcool

	Consommation d'alcool (12 mois)	Consommation régulière	Consommation excessive
Fumant la cigarette	↑		↑
Ayant consommé des drogues au cours des 12 mois précédents	↑		↑
Ayant déjà eu une relation sexuelle consensuelle au cours de leur vie		↑	
Étudiant au 2e cycle (secondaire 3, 4 et 5)	↑	↑	↑
Ayant un risque élevé de décrochage scolaire	↑		↑
Ayant un faible soutien social dans leur famille	↑		↑
Ayant un faible niveau de supervision parentale			↑
Ayant infligé et subi de la violence lors de leurs relations amoureuses			↑
Ayant manifesté au moins un comportement d'agressivité directe			↑
Ayant un niveau élevé de détresse psychologique	↑		↑

Source :

Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS), 2022-2023
 Rapport provincial : <https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/enquete-quebecoise-sante-jeunes-secondaire-2022-2023.pdf>

Questions ou commentaires ?



Courriel :
Téléphone :

Guillaume Beaulé, Direction de santé publique
 guillaume_beaulé@ssss.gouv.qc.ca
 819 764-3264, poste 49211