



2022-2023

SANTÉ DES JEUNES DU SECONDAIRE

Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue

Alcool et drogues →

Élèves ayant eu au moins un épisode de consommation régulière d'alcool au cours de leur vie

DE QUOI EST-IL QUESTION ?

La consommation régulière d'alcool est définie par le fait de consommer au moins une fois par semaine, pendant une période d'au moins un mois, au moins une fois au cours de sa vie. La proportion est calculée par rapport aux élèves ayant consommé de l'alcool au cours des 12 mois précédant l'enquête.

Élèves ayant eu au moins un épisode de consommation régulière d'alcool (à vie)

Élèves de 12 à 17 ans

Territoires	Sexes réunis		Garçons		Filles	
	N ^e	%	N ^e	%	N ^e	%
Abitibi-Témiscamingue	900	18 =	500	20 ↑	400	15 =
Québec	33 200	16	16 200	16	17 100	16

N^e Nombre estimé

= % régional comparable à celui du reste du Québec (l'écart entre les deux résultats n'est pas significatif)

↑ % régional plus élevé que celui du reste du Québec

Notes

Dans le tableau précédent, la comparaison des données (représentée par le symbole = et ↑) est effectuée entre le pourcentage régional et celui du reste du Québec, c'est-à-dire l'ensemble du Québec excluant la région. Néanmoins, les données « Québec » présentées dans ce tableau se rapportent bien à l'ensemble du Québec, qui inclut la région.


Le total peut différer de la somme des parties en raison de l'arrondissement des estimations.

FAITS SAILLANTS

En Abitibi-Témiscamingue, parmi les élèves ayant consommé de l'alcool au cours des 12 mois précédents, 18 % ont connu au moins un épisode de consommation régulière d'alcool au cours de leur vie. Les garçons étaient plus nombreux que les filles à rapporter un tel épisode, 20 % contre 15 %. Les données régionales sont comparables à celles du reste du Québec, sauf en ce qui concerne les garçons, qui étaient relativement plus nombreux dans la région que ceux dans le reste de la province (20 % contre 16 %).

Évolution dans le temps

Proportion (%) d'élèves ayant eu au moins un épisode de consommation régulière d'alcool au cours de leur vie, Abitibi-Témiscamingue et Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023



↓ Pourcentage significativement plus faible qu'en 2010-2011

Faits saillants

De 2010-2011 à 2022-2023, on note aucun écart significatif dans la région en ce qui concerne la proportion d'élèves ayant eu au moins un épisode de consommation régulière d'alcool au cours de leur vie, les résultats étant comparables sur le plan statistique. Par contre, au Québec, on observe des proportions plus faibles en 2016-2017 et en 2022-2023, par rapport à celle de 2010-2011.

Qu'est-ce qui influence les résultats ?



La santé d'un individu est influencée par de nombreux facteurs. L'EQSJS permet de dégager des caractéristiques liées à diverses problématiques ou comportements chez les jeunes. Dans le tableau suivant, la flèche (↑) indique que le pourcentage d'élèves est plus élevé parmi ceux présentant la caractéristique mentionnée. Exemple : les élèves fumant la cigarette (premier facteur dans la liste) sont proportionnellement plus nombreux que les non-fumeurs à avoir consommé de l'alcool au moins une fois dans les 12 mois précédents. Cela ne signifie pas que le tabagisme entraîne la consommation d'alcool chez les jeunes mais qu'il existe une association statistique entre les deux. On peut aussi constater la présence d'une association entre le tabagisme et la consommation excessive d'alcool. Les autres indicateurs sur l'alcool font également l'objet d'une fiche qu'il est possible de consulter. À noter que l'absence de flèche signifie que le croisement des variables n'a pu être effectué et qu'il n'est pas possible de mesurer l'association statistique.

Indicateurs sur l'alcool

Facteurs qui influencent les indicateurs sur l'alcool

	Consommation d'alcool (12 mois)	Consommation régulière	Consommation excessive
Fumant la cigarette	↑		↑
Ayant consommé des drogues au cours des 12 mois précédents	↑		↑
Ayant déjà eu une relation sexuelle consensuelle au cours de leur vie		↑	
Étudiant au 2e cycle (secondaire 3, 4 et 5)	↑	↑	↑
Ayant un risque élevé de décrochage scolaire	↑		↑
Ayant un faible soutien social dans leur famille	↑		↑
Ayant un faible niveau de supervision parentale			↑
Ayant infligé et subi de la violence lors de leurs relations amoureuses			↑
Ayant manifesté au moins un comportement d'agressivité directe			↑
Ayant un niveau élevé de détresse psychologique	↑		↑

Source :

Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS), 2022-2023
 Rapport provincial : <https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/enquete-quebecoise-sante-jeunes-secondaire-2022-2023.pdf>

Questions ou commentaires ?



Courriel :

Téléphone :

Guillaume Beaulé, Direction de santé publique

guillaume_beaulé@ssss.gouv.qc.ca

819 764-3264, poste 49211