



2016-2017

SANTÉ DES JEUNES DU SECONDAIRE

Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue

SEXUALITÉ →

Répartition des élèves ayant déjà eu une relation sexuelle consensuelle au cours de leur vie selon le nombre de partenaires

DE QUOI EST-IL QUESTION ?

Il est généralement admis que le fait d'avoir eu trois partenaires ou plus représente un facteur de risque, pour les grossesses involontaires et les infections transmissibles sexuellement ou par le sang (ITSS). Contrairement aux autres thèmes de l'enquête, les questions sur la sexualité ont été posées seulement aux élèves de 14 à 17 ans.

Répartition des élèves selon le nombre de partenaires sexuels (au cours de leur vie)

Élèves de 14 à 17 ans



Territoires	Sexes réunis		Garçons		Filles	
	N ^e	%	N ^e	%	N ^e	%
1 partenaire						
Abitibi-Témiscamingue	1 100	51 =	500	51 =	600	51 =
Québec	43 300	49	21 100	47	22 200	51
2 partenaires						
Abitibi-Témiscamingue	400	20 =	200	20 =	200	19 =
Québec	17 700	20	9 100	20	8 700	20
3 partenaires ou plus						
Abitibi-Témiscamingue	600	29 =	300	29 =	300	30 =
Québec	27 000	31	14 700	33	12 300	29

N^e Nombre estimé

= % régional comparable à celui du reste du Québec (l'écart entre les deux résultats n'est pas significatif)

Notes


Dans le tableau précédent, la comparaison des données (représentée par le symbole =) est effectuée entre le pourcentage régional et celui du reste du Québec, c'est-à-dire l'ensemble du Québec excluant la région. Néanmoins, les données « Québec » présentées dans ce tableau se rapportent bien à l'ensemble du Québec, qui inclut la région.

Le total peut différer de la somme des parties en raison de l'arrondissement des estimations.

FAITS SAILLANTS

Dans la région comme au Québec, un élève sur deux (51 %) ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle au cours de sa vie n'a eu qu'un seul partenaire sexuel. Un élève sur cinq (20 %) a connu 2 partenaires sexuels alors que moins d'un élève sur trois (29 %) a eu 3 partenaires sexuels ou plus. Dans tous les cas, on observe des résultats semblables chez les garçons et chez les filles.

Répartition (%) des élèves ayant déjà eu une relation sexuelle consensuelle au cours de leur vie selon le nombre de partenaires sexuels, Abitibi-Témiscamingue, 2016-2017



Évolution dans le temps

En raison de modifications dans les questions posées aux élèves sur le sujet, il est impossible d'effectuer une comparaison entre les données de 2010-2011 et celles de 2016-2017.

Qu'est-ce qui influence les résultats ?



La santé d'un individu est influencée par de nombreux facteurs. L'EQSJS permet de dégager des caractéristiques liées à diverses problématiques ou comportements chez les jeunes. Dans le tableau suivant, la flèche (↑) indique que le pourcentage d'élèves est plus élevé parmi ceux présentant la caractéristique mentionnée. À l'inverse, la flèche (↓) signifie que le pourcentage d'élèves est plus faible. Exemple : les élèves ayant manifesté une conduite imprudente ou rebelle sont proportionnellement plus nombreux que les autres à avoir déjà eu une relation sexuelle. Cela ne signifie pas que les conduites imprudentes stimulent la sexualité des jeunes mais qu'il existe une association statistique entre les deux. On peut aussi constater la présence d'une association entre cette caractéristique et les trois autres indicateurs sur la sexualité, qui font également l'objet d'une fiche qu'il est possible de consulter.

Indicateurs sur la sexualité

Facteurs qui influencent les indicateurs sur la sexualité

Facteurs qui influencent les indicateurs sur la sexualité	Ayant déjà eu au moins une relation sexuelle	Ayant eu 3 partenaires sexuels ou plus	Utilisation du condom	Contraception d'urgence
Fumant la cigarette	↑	↑		
Ayant consommé de l'alcool au cours des 12 mois précédents	↑			
Ayant eu une consommation excessive d'alcool au cours des 12 mois précédents	↑			
Ayant consommé des drogues au cours des 12 mois précédents	↑		↓	
Ayant une attirance sexuelle pour une personne du même sexe		↑		
Ayant un risque élevé de décrochage scolaire	↑	↑		
Étudiant au 2e cycle (secondaire 3, 4 et 5)	↑		↓	↑
Ayant manifesté une conduite imprudente ou rebelle au cours des 12 mois précédents	↑	↑	↓	↑
Ayant un faible soutien social dans leur famille		↑		
Vivant dans des familles reconstituées ou monoparentales	↑	↑		
Ayant un faible niveau de supervision parentale	↑	↑		
Ayant un niveau élevé de détresse psychologique	↑	↑	↓	

Source :

Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS), 2016-2017
 Rapport provincial : <http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/enfants-ados/alimentation/sante-jeunes-secondaire-2016-2017-t3.html>

Questions ou commentaires ?



Courriel :

Téléphone :

Guillaume Beaulé, Direction de santé publique

guillaume_beaule@ssss.gouv.qc.ca

819 764-3264, poste 49211