



2016-2017

SANTÉ DES JEUNES DU SECONDAIRE

Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue

Tabagisme →

Élèves fumant la cigarette chaque jour ou à l'occasion

DE QUOI EST-IL QUESTION ?

Dans l'enquête, les fumeurs quotidiens et occasionnels, ayant fumé 100 cigarettes ou plus au cours de leur vie et ayant consommé au cours des 30 jours précédents, sont regroupés sous l'expression « fumeurs actuels ». Les « fumeurs débutants » sont des élèves ayant fumé moins de 100 cigarettes au cours de leur vie, et ayant consommé au cours des 30 jours précédents. Par conséquent, ce ne sont pas de « nouveaux » fumeurs, seule la quantité de cigarettes fumées les différencie des fumeurs actuels. Enfin, la catégorie « non-fumeurs » rassemble les anciens fumeurs (ayant fumé 100 cigarettes ou plus au cours de leur vie mais n'ayant pas consommé au cours des 30 jours précédents), les « anciens expérimentateurs » (ayant fumé moins de 100 cigarettes au cours de leur vie et n'ayant pas consommé au cours des 30 jours précédents) ainsi que les « non-fumeurs depuis toujours » (n'ayant jamais fumé ou ayant consommé moins d'une cigarette complète).

Élèves fumant la cigarette chaque jour ou à l'occasion

Élèves de 12 à 17 ans

Territoires	Sexes réunis		Garçons		Filles	
	N ^e	%	N ^e	%	N ^e	%
Abitibi-Témiscamingue	400	5 ↑	200	6 ↑	100	4 ↑
Québec	13 100	3	7 400	3	5 600	3

N^e Nombre estimé
↑ % régional plus élevé que celui du reste du Québec

Notes

Dans le tableau précédent, la comparaison des données (représentée par le symbole ↑) est effectuée entre le pourcentage régional et celui du reste du Québec, c'est-à-dire l'ensemble du Québec excluant la région. Néanmoins, les données « Québec » présentées dans ce tableau se rapportent bien à l'ensemble du Québec, qui inclut la région.


Le total peut différer de la somme des parties en raison de l'arrondissement des estimations.

FAITS SAILLANTS

En Abitibi-Témiscamingue, 5 % des élèves étaient des « fumeurs actuels » (regroupant les fumeurs quotidiens et occasionnels), un résultat supérieur à celui du reste de la province (3 %). Les garçons (6 %) étaient plus nombreux que les filles (4 %) dans cette situation. Dans les deux cas, ces proportions régionales sont plus élevées que celles du reste du Québec (respectivement 3 % et 3 %).

En ce qui concerne l'âge d'initiation à la cigarette (données non illustrées), 4 % des élèves de 13 ans et plus avaient fumé leur première cigarette complète avant l'âge de 13 ans, un pourcentage plus élevé que celui du reste de la province (3 %). Il n'y a pas d'écart significatif entre les garçons (5 %) et les filles (3 %). Dans les deux cas, les proportions régionales sont supérieures à celles du reste du Québec (respectivement 3 % et 2 %). On observe une diminution importante de ce pourcentage entre l'enquête réalisée en 2010-2011 et celle de 2016-2017, celui-ci étant passé de 12 % à 4 % dans la région. Au Québec, il a également diminué de 8 % à 3 % durant cette période.

Répartition (%) des élèves selon le statut de fumeur, Abitibi-Témiscamingue et Québec, 2016-2017



↑ Pourcentage significativement plus élevé que celui du reste du Québec

↓ Pourcentage significativement plus faible que celui du reste du Québec


* Attention, estimation de qualité moyenne, à utiliser avec prudence

En ce qui concerne les fumeurs quotidiens, occasionnels et débutants, les proportions régionales s'avèrent plus élevées que celles du reste de la province. À l'inverse, la proportion de non-fumeurs depuis toujours est plus faible en Abitibi-Témiscamingue que dans le reste du Québec (86 % contre 90 %).

De 2010-2011 à 2016-2017, la proportion de « non-fumeurs » (soit les anciens fumeurs, les anciens expérimentateurs et les non-fumeurs depuis toujours) a augmenté dans la région, de 89 % à 92 %. Au Québec, elle est passée de 90 % à 95 % durant la même période (données non illustrées).

Évolution dans le temps

Proportion (%) d'élèves fumant la cigarette chaque jour ou à l'occasion, Abitibi-Témiscamingue et Québec, 2010-2011 et 2016-2017



↓ Pourcentage significativement plus faible qu'en 2010-2011

Faits saillants

La proportion d'élèves fumant la cigarette chaque jour ou à l'occasion a diminué dans la région depuis 2010-2011, où elle se situait à 8 %. Cette baisse est également observable au Québec (de 7 % à 3 %) durant la même période.

Qu'est-ce qui influence les résultats ?



La santé d'un individu est influencée par de nombreux facteurs. L'EQSJS permet de dégager des caractéristiques liées à diverses problématiques ou comportements chez les jeunes. Dans le tableau suivant, la flèche (↑) indique que le pourcentage d'élèves est plus élevé parmi ceux présentant la caractéristique mentionnée. Exemple : les élèves fumant la cigarette (premier facteur dans la liste) sont proportionnellement plus nombreux que les non-fumeurs à avoir fumé des cigarillos ou utilisé la cigarette électronique. Cela ne signifie pas que le tabagisme entraîne automatiquement la consommation de cigarillos mais qu'il existe une association statistique entre les deux. Les autres indicateurs sur le tabagisme font également l'objet d'une fiche qu'il est possible de consulter.

Indicateurs sur le tabagisme

Facteurs qui influencent les indicateurs sur le tabagisme

	Fumeurs actuels	Fumeurs de cigarillos	Fumeurs de cigarettes électroniques
Fumant la cigarette		↑	↑
Ayant consommé de l'alcool au cours des 12 mois précédents		↑	↑
Ayant consommé de la drogue au cours des 12 mois précédents		↑	↑
Ayant essayé de perdre du poids		↑	
Étant actifs physiquement dans les loisirs et les transports			↑
Ayant occupé un emploi durant l'année scolaire		↑	↑
Étudiant au 2 ^e cycle (secondaire 3, 4 et 5)		↑	↑
Ayant un risque élevé de décrochage scolaire		↑	↑
Vivant dans une famille reconstituée		↑	↑
Dont un seul parent occupe un emploi		↑	
Ayant un faible soutien social dans leur famille	↑	↑	↑
Ayant une faible participation dans leur famille		↑	↑
Percevant leur santé comme passable ou mauvaise			↑
Ayant un diagnostic d'anxiété, de dépression ou de troubles alimentaires		↑	↑
Ayant un niveau élevé de détresse psychologique		↑	↑
Ayant un faible niveau sur l'échelle d'estime de soi		↑	↑

Source :

Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS), 2016-2017
 Rapport provincial : <http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/enfants-ados/alimentation/sante-jeunes-secondaire-2016-2017-t3.html>

Questions ou commentaires ?



Courriel :

Téléphone :

Guillaume Beaulé, Direction de santé publique

guillaume_beaule@ssss.gouv.qc.ca

819 764-3264, poste 49211