



2016-2017

SANTÉ DES JEUNES DU SECONDAIRE

Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue

Tabagisme →

Élèves ayant fumé le cigarillo ou le petit cigare
au cours des 30 jours précédents

DE QUOI EST-IL QUESTION ?

Depuis quelques années, d'autres produits du tabac ont fait leur apparition sur le marché. On a demandé aux élèves s'ils avaient fumé au moins un cigarillo ou un petit cigare au cours des 30 jours précédents, même s'il ne s'agissait que de quelques bouffées.

Élèves ayant fumé le cigarillo ou le petit cigare au cours des 30 jours précédents

Élèves de 12 à 17 ans

Territoires	Sexes réunis		Garçons		Filles	
	N ^e	%	N ^e	%	N ^e	%
Abitibi-Témiscamingue	900	13 ↑	600	16 ↑	400	10 ↑
Québec	37 400	10	22 200	11	15 300	8

N^e Nombre estimé

↑ % régional plus élevé que celui du reste du Québec

Notes


Dans le tableau précédent, la comparaison des données (représentée par le symbole ↑) est effectuée entre le pourcentage régional et celui du reste du Québec, c'est-à-dire l'ensemble du Québec excluant la région. Néanmoins, les données « Québec » présentées dans ce tableau se rapportent bien à l'ensemble du Québec, qui inclut la région.

Le total peut différer de la somme des parties en raison de l'arrondissement des estimations.

FAITS SAILLANTS

Dans la région, 13 % des élèves avaient fumé au moins un cigarillo au cours des 30 jours précédents, un résultat plus élevé que dans le reste de la province (10 %). Plus de garçons (16 %) que de filles (10 %) avaient consommé un tel produit. Ici également, les deux proportions régionales s'avèrent supérieures à celles du reste du Québec (11 % et 8 % respectivement).

Répartition (%) des élèves ayant fumé au moins un cigarillo au cours des 30 jours précédents, selon la fréquence, Abitibi-Témiscamingue, 2016-2017



* Attention, estimation de qualité moyenne, à utiliser avec prudence

Il faut spécifier que durant cette période de 30 jours, une majorité (52 %) de fumeurs de cigarillos en ont consommés que pendant un ou deux jours. Un fumeur de cigarillos sur quatre (26 %) en a fumés durant quelques jours seulement. C'était donc une minorité de fumeurs de cigarillos qui représentaient des consommateurs réguliers, 10 % les ayant consommés presque tous les jours et 12 % quotidiennement. Dans tous les cas, ces résultats sont comparables à ceux du reste de la province.

À noter que dans la région (données non illustrées), 2 % des élèves ont consommé seulement des cigarettes (sans cigarillo) et 6 % seulement des cigarillos (sans cigarette) au cours des 30 jours précédents, des résultats comparables à ceux du reste du Québec. De plus, 6 % des élèves ont fumé des cigarettes et des cigarillos, un pourcentage supérieur à celui du reste du Québec (4 %).

Évolution dans le temps

Faits saillants

Étant donné qu'il s'agit d'un nouvel indicateur en 2016-2017, aucune comparaison n'est possible avec l'enquête réalisée en 2010-2011. Toutefois, les résultats d'une autre enquête provinciale, l'ETADJES, indiquaient une diminution de la proportion de fumeurs de cigarillos au Québec, de 18 % à 7 %, entre 2008 et 2013.

Qu'est-ce qui influence les résultats ?



La santé d'un individu est influencée par de nombreux facteurs. L'EQSJS permet de dégager des caractéristiques liées à diverses problématiques ou comportements chez les jeunes. Dans le tableau suivant, la flèche (↑) indique que le pourcentage d'élèves est plus élevé parmi ceux présentant la caractéristique mentionnée. Exemple : les élèves fumant la cigarette (premier facteur dans la liste) sont proportionnellement plus nombreux que les non-fumeurs à avoir fumé des cigarillos ou utilisé la cigarette électronique. Cela ne signifie pas que le tabagisme entraîne automatiquement la consommation de cigarillos mais qu'il existe une association statistique entre les deux. Les autres indicateurs sur le tabagisme font également l'objet d'une fiche qu'il est possible de consulter.

Indicateurs sur le tabagisme

Facteurs qui influencent les indicateurs sur le tabagisme

	Fumeurs actuels	Fumeurs de cigarillos	Fumeurs de cigarettes électroniques
Fumant la cigarette		↑	↑
Ayant consommé de l'alcool au cours des 12 mois précédents		↑	↑
Ayant consommé de la drogue au cours des 12 mois précédents		↑	↑
Ayant essayé de perdre du poids		↑	
Étant actifs physiquement dans les loisirs et les transports			↑
Ayant occupé un emploi durant l'année scolaire		↑	↑
Étudiant au 2 ^e cycle (secondaire 3, 4 et 5)		↑	↑
Ayant un risque élevé de décrochage scolaire		↑	↑
Vivant dans une famille reconstituée		↑	↑
Dont un seul parent occupe un emploi		↑	
Ayant un faible soutien social dans leur famille	↑	↑	↑
Ayant une faible participation dans leur famille		↑	↑
Percevant leur santé comme passable ou mauvaise			↑
Ayant un diagnostic d'anxiété, de dépression ou de troubles alimentaires		↑	↑
Ayant un niveau élevé de détresse psychologique		↑	↑
Ayant un faible niveau sur l'échelle d'estime de soi		↑	↑

Source :

Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS), 2016-2017
 Rapport provincial : <http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/enfants-ados/alimentation/sante-jeunes-secondaire-2016-2017-t3.html>

Questions ou commentaires ?



Courriel :

Téléphone :

Guillaume Beaulé, Direction de santé publique

guillaume_beaule@ssss.gouv.qc.ca

819 764-3264, poste 49211