



SANTÉ DES JEUNES DU SECONDAIRE

2022-2023

Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue

Tabagisme →

Élèves ayant consommé un autre produit du tabac au cours des 30 jours précédents

DE QUOI EST-IL QUESTION ?

Depuis quelques années, d'autres produits du tabac ont fait leur apparition sur le marché. On a demandé aux élèves s'ils avaient consommé un produit du tabac autre que la cigarette ou la cigarette électronique au cours des 30 jours précédents, comme le cigare, le cigarillo, le petit cigare, la pipe à eau ou shisha, le tabac à mâcher, le tabac chauffé ou autre.

Élèves ayant consommé un autre produit du tabac au cours des 30 jours précédents

Élèves de 12 à 17 ans

Territoires	Sexes réunis		Garçons		Filles	
	N ^e	%	N ^e	%	N ^e	%
Abitibi-Témiscamingue	300	4 ↑	300	7 ↑	100	2 *
Québec	13 500	3	8 700	4	4 800	2

N^e Nombre estimé

↑ % régional plus élevé que celui du reste du Québec

* Estimation de qualité moyenne, la proportion doit être interprétée avec prudence

Notes

Dans le tableau précédent, la comparaison des données (représentée par le symbole ↑) est effectuée entre le pourcentage régional et celui du reste du Québec, c'est-à-dire l'ensemble du Québec excluant la région. Néanmoins, les données « Québec » présentées dans ce tableau se rapportent bien à l'ensemble du Québec, qui inclut la région.


Le total peut différer de la somme des parties en raison de l'arrondissement des estimations.

FAITS SAILLANTS

Dans la région, 4 % des élèves avaient consommé un produit du tabac autre que la cigarette ou la cigarette électronique au cours des 30 jours précédents, un résultat plus élevé que dans le reste de la province (3 %). Plus de garçons (7 %) que de filles (2 %) avaient consommé un tel produit. Chez les garçons, la proportion régionale s'avère supérieure à celle du reste du Québec (4 %).

Évolution dans le temps

Proportion (%) d'élèves ayant consommé un produit du tabac autre que la cigarette ou la cigarette électronique au cours des 30 jours précédents, Abitibi-Témiscamingue et Québec, 2016-2017 et 2022-2023



↓ Pourcentage significativement plus faible que celui du cycle précédent

Faits saillants

La proportion d'élèves ayant consommé un produit du tabac autre que la cigarette ou la cigarette électronique a diminué dans la région depuis 2016-2017, où elle se situait à 14 %. Cette baisse est également observable au Québec (de 10 % à 3 %) durant la même période. Plus particulièrement chez les garçons, la proportion régionale est passée de 17 % à 7 % (donnée non-illustrée).

Qu'est-ce qui influence les résultats ?



La santé d'un individu est influencée par de nombreux facteurs. L'EQSJS permet de dégager des caractéristiques liées à diverses problématiques ou comportements chez les jeunes. Dans le tableau suivant, la flèche (↑) indique que le pourcentage d'élèves est plus élevé parmi ceux présentant la caractéristique mentionnée. Exemple : les élèves ayant consommé de l'alcool (premier facteur dans la liste) sont proportionnellement plus nombreux que les autres à avoir utilisé la cigarette électronique. Cela ne signifie pas que la consommation d'alcool entraîne automatiquement le vapotage mais qu'il existe une association statistique entre les deux. Les autres indicateurs sur le tabagisme font également l'objet d'une fiche qu'il est possible de consulter.

Facteurs qui influencent les indicateurs sur le tabagisme

	Fumeurs actuels	Fumeurs de cigarettes électroniques
Ayant consommé de l'alcool au cours des 12 mois précédents		↑
Ayant eu une consommation excessive d'alcool		↑
Ayant consommé de la drogue au cours des 12 mois précédents	↑	↑
Ayant essayé de perdre du poids		↑
Étant peu actifs ou inactifs physiquement dans les loisirs et les transports		↑
Ayant occupé un emploi durant l'année scolaire		↑
Étudiant au 2e cycle (secondaire 3, 4 et 5)		↑
Ayant un risque élevé de décrochage scolaire		↑
Vivant dans une famille reconstituée		↑
Dont un seul parent occupe un emploi		↑
Ayant un faible soutien social dans leur famille	↑	↑
Ayant une faible participation dans leur famille		↑
Percevant leur santé comme passable ou mauvaise		↑
Ayant un diagnostic d'anxiété, de dépression ou de troubles alimentaires	↑	↑
Ayant un niveau élevé de détresse psychologique		↑
Ayant un faible niveau sur l'échelle d'estime de soi	↑	↑

Source :

Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS), 2022-2023
 Rapport provincial : <https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/enquete-quebecoise-sante-jeunes-secondaire-2022-2023.pdf>

Questions ou commentaires ?



Courriel :
Téléphone :

Guillaume Beaulé, Direction de santé publique
 guillaume_beaule@ssss.gouv.qc.ca
 819 764-3264, poste 49211