



SANTÉ DES JEUNES DU SECONDAIRE

2022-2023

Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue

Élèves ayant utilisé une cigarette électronique
au cours des 30 jours précédents

Tabagisme →

DE QUOI EST-IL QUESTION ?

Depuis quelques années, d'autres produits du tabac ont fait leur apparition sur le marché. On a demandé aux élèves s'ils avaient utilisé une cigarette électronique au cours des 30 jours précédents, même s'il ne s'agissait que de quelques bouffées.

Élèves ayant utilisé une cigarette électronique au cours des 30 jours précédents

Élèves de 12 à 17 ans

Territoires	Sexes réunis		Garçons		Filles	
	N ^e	%	N ^e	%	N ^e	%
Abitibi-Témiscamingue	1 800	22 ↑	900	22 ↑	900	22 ↑
Québec	71 400	16	30 900	13	40 600	19

N^e Nombre estimé
↑ % régional plus élevé que celui du reste du Québec

Notes

Dans le tableau précédent, la comparaison des données (représentée par le symbole ↑) est effectuée entre le pourcentage régional et celui du reste du Québec, c'est-à-dire l'ensemble du Québec excluant la région. Néanmoins, les données « Québec » présentées dans ce tableau se rapportent bien à l'ensemble du Québec, qui inclut la région.

Le total peut différer de la somme des parties en raison de l'arrondissement des estimations.


FAITS SAILLANTS

Dans la région, un élève sur cinq (22 %) a utilisé la cigarette électronique au cours des 30 jours précédents, un résultat plus élevé que dans le reste du Québec (16 %). Autant de garçons (22 %) que de filles (22 %) avaient consommé un tel produit, et ces deux proportions régionales s'avéraient plus élevées que celles du reste de la province (respectivement 13 % et 19 %).

Comme au Québec, la très grande majorité des élèves de la région (96 %) ayant vapoté au cours des 30 jours précédents ont utilisé une cigarette électronique contenant de la nicotine et ce, autant chez les garçons que chez les filles.

Évolution dans le temps

Proportion (%) d'élèves ayant utilisé une cigarette électronique au cours des 30 jours précédents, Abitibi-Témiscamingue et Québec, 2016-2017 et 2022-2023



↑ Pourcentage significativement plus élevé que celui du cycle précédent

Faits saillants

La proportion d'élèves ayant utilisé une cigarette électronique au cours des 30 jours précédents est demeurée stable dans la région de 2016-2017 à 2022-2023, l'écart de 2 points n'étant pas significatif. Le constat se répète chez les garçons. Cependant, chez les filles, la proportion régionale a augmenté significativement de 14 % à 22 % durant la période étudiée. Au Québec, dans l'ensemble, la proportion est passée de 11 % à 16 % et chez les filles, de 8 % à 19 %.

Qu'est-ce qui influence les résultats ?



La santé d'un individu est influencée par de nombreux facteurs. L'EQSJS permet de dégager des caractéristiques liées à diverses problématiques ou comportements chez les jeunes. Dans le tableau suivant, la flèche (↑) indique que le pourcentage d'élèves est plus élevé parmi ceux présentant la caractéristique mentionnée. Exemple : les élèves ayant consommé de l'alcool (premier facteur dans la liste) sont proportionnellement plus nombreux que les autres à avoir utilisé la cigarette électronique. Cela ne signifie pas que la consommation d'alcool entraîne automatiquement le vapotage mais qu'il existe une association statistique entre les deux. Les autres indicateurs sur le tabagisme font également l'objet d'une fiche qu'il est possible de consulter.

Facteurs qui influencent les indicateurs sur le tabagisme	Fumeurs actuels	Fumeurs de cigarettes électroniques
Ayant consommé de l'alcool au cours des 12 mois précédents		↑
Ayant eu une consommation excessive d'alcool		↑
Ayant consommé de la drogue au cours des 12 mois précédents	↑	↑
Ayant essayé de perdre du poids		↑
Étant peu actifs ou inactifs physiquement dans les loisirs et les transports		↑
Ayant occupé un emploi durant l'année scolaire		↑
Étudiant au 2e cycle (secondaire 3, 4 et 5)		↑
Ayant un risque élevé de décrochage scolaire		↑
Vivant dans une famille reconstituée		↑
Dont un seul parent occupe un emploi		↑
Ayant un faible soutien social dans leur famille	↑	↑
Ayant une faible participation dans leur famille		↑
Percevant leur santé comme passable ou mauvaise		↑
Ayant un diagnostic d'anxiété, de dépression ou de troubles alimentaires	↑	↑
Ayant un niveau élevé de détresse psychologique		↑
Ayant un faible niveau sur l'échelle d'estime de soi	↑	↑

Source :

Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS), 2022-2023
 Rapport provincial : <https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/enquete-quebecoise-sante-jeunes-secondaire-2022-2023.pdf>

Questions ou commentaires ?



Guillaume Beaulé, Direction de santé publique
 Courriel : guillaume_beaule@ssss.gouv.qc.ca
 Téléphone : 819 764-3264, poste 49211