

Taux de prévalence des troubles mentaux

(2019-2020)

Mise à jour : Août 2021

Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue
PORTRAIT DE SANTÉ

ÉTAT de santé



SANTÉ MENTALE

DÉFINITION



Les troubles mentaux regroupent entre autres les troubles anxio-dépressifs, l'hyperactivité, les abus de substances psychoactives, les troubles psychotiques, ceux de la personnalité et les retards de développement.

Nombre : Nombre de personnes de 18 ans et plus, d'un territoire donné, atteintes d'un trouble mental au cours de l'année financière 2019-2020.

Une personne assurée par le régime public d'assurance maladie du Québec est considérée comme étant atteinte d'un trouble mental si elle a :

- un diagnostic principal de trouble mental inscrit au fichier des hospitalisations MED-ECHO au cours de l'année, OU
 - un diagnostic de trouble mental enregistré au fichier des services médicaux rémunérés à l'acte au cours de l'année.
- Par conséquent, les données présentées ici sont en partie influencées par l'organisation des services propre à chaque territoire.

Proportion : Nombre de personnes de 18 ans et plus, d'un territoire donné, atteintes d'un trouble mental au cours de l'année financière 2019-2020, rapporté à la population de 18 ans et plus du même territoire au milieu de la période, multiplié par 100.

SOURCE



Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ).

NOTES



Contrairement aux troubles anxio-dépressifs et schizophréniques, ici les tests statistiques établissent une comparaison entre la région et l'ensemble du Québec.

Les données du SISMACQ sous-estiment la réalité dans la MRC de Témiscamingue. En effet, elles utilisent des informations issues du fichier des services rémunérés à l'acte. Or, un certain nombre de médecins pratiquant dans ce territoire ne sont pas rémunérés à l'acte mais selon d'autres modes de rémunération alternatifs. De plus, il est probable qu'une partie de la population aille chercher des services médicaux en Ontario, services qui ne sont pas comptabilisés dans le SISMACQ. Les résultats présentés pour la MRC de Témiscamingue doivent donc être considérés comme des minimums.

En raison de la procédure d'arrondissement aléatoire effectué par l'Institut national de santé publique du Québec, il est possible que le total diffère de la somme des parties.

En 2016, le système de facturation des services médicaux rémunérés à l'acte a été modernisé. Ces modifications ont entraîné une diminution de la saisie des codes de diagnostic dans le fichier des services médicaux rémunérés à l'acte. Par conséquent, les données doivent être interprétées avec prudence à partir de 2016-2017, une forte sous-estimation pouvant résulter de ces changements.


Taux de prévalence des troubles mentaux (2019-2020)

Territoires	Population de 18 ans et plus					
	Sexes réunis		Hommes		Femmes	
	N	%	N	%	N	%
MRC de Témiscamingue	1 165	9,0 ●	485	7,3 ●	680	10,8 ●
Ville de Rouyn-Noranda	5 225	15,3 ●	2 055	12,0 ●	3 175	18,6 ●
MRC d'Abitibi-Ouest	2 545	15,5 ●	1 070	12,8 ●	1 475	18,3 ●
MRC d'Abitibi	2 920	14,7 ●	1 170	11,6 ●	1 750	17,9 ●
MRC de la Vallée-de-l'Or	4 075	11,8 ●	1 710	9,7 ●	2 360	13,9 ●
Abitibi-Témiscamingue	15 925	13,5 ●	6 490	10,8 ●	9 435	16,2 ●
Québec	726 580	10,6	285 230	8,5	441 350	12,7

- N Nombre
- Situation plus favorable que celle de l'ensemble du Québec (différence statistique significative)
- Situation plus défavorable que celle de l'ensemble du Québec (différence statistique significative)

Évolution dans le temps

Proportion (%) de la population adulte souffrant de troubles mentaux, selon le sexe, Abitibi-Témiscamingue, 2000-2001 à 2019-2020



Coupure en 2016-2017, en raison des modifications apportées au système de facturation des services médicaux rémunérés à l'acte

SOURCE

Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ), 2000-2001 à 2019-2020.


FAITS SAILLANTS

De 2000-2001 à 2013-2014, la proportion de personnes de 18 ans et plus ayant un diagnostic de troubles mentaux a peu varié en Abitibi-Témiscamingue, oscillant en général entre 11 % et 12 %. Elle a augmenté pour atteindre 13 % en 2015-2016, puis 14 % l'année suivante. En 2019-2020, elle se situait à 13,5 %, un résultat plus élevé qu'au Québec (10,6 %).

Plus de femmes que d'hommes ont été diagnostiquées pour ce type de problèmes, un phénomène stable depuis une vingtaine d'années. En 2019-2020, le taux de prévalence régional s'établissait ainsi à 16,2 % chez les femmes comparativement à 10,8 % chez les hommes.

Évolution dans le temps

Proportion (%) de la population adulte souffrant de troubles mentaux, selon le sexe, MRC de Témiscamingue, 2000-2001 à 2019-2020



Coupure en 2016-2017, en raison des modifications apportées au système de facturation des services médicaux rémunérés à l'acte

SOURCE

Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ), 2000-2001 à 2019-2020.


FAITS SAILLANTS

Du milieu à la fin de la décennie 2000, la proportion de personnes de 18 ans et plus ayant un diagnostic de troubles mentaux a augmenté de près de 4 points au Témiscamingue, passant de 7 % à environ 11 %. Par la suite, elle a varié entre 9 % et 10 %. En 2019-2020, moins d'un adulte sur dix (9,0 %) souffrait d'un trouble mental dans ce territoire, une valeur inférieure à celle du Québec (10,6 %) et la plus basse de la région (voir la note technique à la page 2).

Plus de femmes que d'hommes ont été diagnostiquées pour ce type de problèmes, un phénomène stable depuis une vingtaine d'années.

Évolution dans le temps

Proportion (%) de la population adulte souffrant de troubles mentaux, selon le sexe, Ville de Rouyn-Noranda, 2000-2001 à 2019-2020



Coupure en 2016-2017, en raison des modifications apportées au système de facturation des services médicaux rémunérés à l'acte

SOURCE

Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ), 2000-2001 à 2019-2020.


FAITS SAILLANTS

De 2000-2001 à 2013-2014, la proportion de personnes de 18 ans et plus ayant un diagnostic de troubles mentaux a peu varié à Rouyn-Noranda, oscillant en général entre 13 % et 14 %. Elle a augmenté à 15 % en 2015-2016 et à près de 16 % l'année suivante. En 2019-2020, elle se situait à 15,3 %, une valeur significativement supérieure à celle du Québec (10,6 %).

Plus de femmes que d'hommes ont été diagnostiquées pour ce type de problèmes, un phénomène stable depuis une vingtaine d'années.

Évolution dans le temps

Proportion (%) de la population adulte souffrant de troubles mentaux, selon le sexe, MRC d'Abitibi-Ouest, 2000-2001 à 2019-2020



Coupure en 2016-2017, en raison des modifications apportées au système de facturation des services médicaux rémunérés à l'acte

SOURCE

Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ), 2000-2001 à 2019-2020.


FAITS SAILLANTS

Depuis une quinzaine d'années, la proportion de personnes de 18 ans et plus ayant un diagnostic de troubles mentaux a augmenté graduellement dans ce territoire, passant de 11 % à 14 %. En 2019-2020, elle atteignait 15,5 %, une valeur significativement supérieure à celle du Québec (10,6 %) et la plus élevée de la région.

Plus de femmes que d'hommes ont été diagnostiquées pour ce type de problèmes, un phénomène stable depuis une vingtaine d'années.

Évolution dans le temps

Proportion (%) de la population adulte souffrant de troubles mentaux, selon le sexe, MRC d'Abitibi, 2000-2001 à 2019-2020



Coupure en 2016-2017, en raison des modifications apportées au système de facturation des services médicaux rémunérés à l'acte

SOURCE

Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ), 2000-2001 à 2019-2020.


FAITS SAILLANTS

De 2001-2002 à 2015-2016, la proportion de personnes de 18 ans et plus ayant un diagnostic de troubles mentaux a peu varié dans ce territoire, oscillant en général entre 12 % et 13 %. Cependant, elle a subi une hausse importante en 2016-2017, atteignant 16 %. En 2019-2020, elle se situait à 14,7 %, une valeur significativement plus élevée que celle du Québec (10,6 %).

Plus de femmes que d'hommes ont été diagnostiquées pour ce type de problèmes, un phénomène stable depuis une vingtaine d'années.

Évolution dans le temps

Proportion (%) de la population adulte souffrant de troubles mentaux, selon le sexe, MRC de la Vallée-de-l'Or, 2000-2001 à 2019-2020



Coupure en 2016-2017, en raison des modifications apportées au système de facturation des services médicaux rémunérés à l'acte

SOURCE

Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ), 2000-2001 à 2019-2020.

FAITS SAILLANTS

Depuis une vingtaine d'années, la proportion de personnes de 18 ans et plus ayant un diagnostic de troubles mentaux a peu varié dans la Vallée-de-l'Or, oscillant en général entre 11 % et 12 %. En 2019-2020, elle s'établissait à 11,8 %, une valeur significativement supérieure à celle du Québec (10,6 %). Plus de femmes que d'hommes ont été diagnostiquées pour ce type de problèmes, un phénomène stable durant toute la période analysée.