

ÉTAT DE SANTÉ

SANTÉ PHYSIQUE

Taux d'incidence du cancer du côlon-rectum (2006-2010)

Mise à jour Juillet 2013

DÉFINITION

Nombre : Nombre annuel moyen de nouveaux cas de cancer du côlon-rectum enregistrés chez les résidents d'un territoire donné, au cours d'une période donnée.

Taux pour 100 000 : Rapport pour une période donnée du nombre annuel moyen de nouveaux cas de cancer du côlon-rectum enregistrés chez les résidents d'un territoire donné à la population moyenne du même territoire pour la même période, multiplié par 100 000. Le taux est ensuite ajusté selon la méthode de standardisation directe avec la population du Québec de 2006 comme population de référence.

SOURCE

Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, fichier des tumeurs, 2006 à 2010. Estimations et projections démographiques. Traitement des données réalisé par l'Infocentre de santé publique du Québec.

NOTE

Depuis 2008, le Québec utilise la 3^e Classification internationale des maladies en oncologie (CIM-O-3) pour classer les différents cas de cancer. L'ensemble du fichier du Québec (1984-2007) a aussi été révisé selon la CIM-O-3, mieux adaptée et spécifique à la problématique du cancer que la Classification internationale des maladies (10^e révision) utilisée auparavant. En conséquence, il n'est pas recommandé de comparer un taux calculé à partir de la version précédente du fichier des tumeurs avec un taux calculé selon la nouvelle version. L'ensemble des données présentées ici ont été calculées avec la nouvelle version du fichier.

Les tests statistiques établissent une comparaison entre la région et le reste du Québec, c'est-à-dire l'ensemble du Québec excluant la région. Néanmoins, les données québécoises présentées dans le tableau se rapportent bien à l'ensemble du Québec.

Taux d'incidence du cancer du côlon-rectum (2006-2010)

Territoires	Sexes réunis		Hommes		Femmes	
	N moy/an	Taux/100 000	N moy/an	Taux/100 000	N moy/an	Taux/100 000
CSSS du Témiscamingue	10	58 ■	5	65 *	5	54 *
CSSS de Rouyn-Noranda	27	68 ■	14	80 ■	13	59 ■
CSSS des Aurores-Boréales	20	84 ■	12	106 ■	8	64 *
CSSS Les Eskers de l'Abitibi	13	56 ■	8	73 ■	5	40 *
CSSS de la Vallée-de-l'Or	32	81 ■	18	101 ■	14	65 ■
Région A.-T.	103	71 ■	58	87 ■	45	58 ■
Québec	5 532	69	3 002	84	2 529	57

N moy/an

Nombre annuel moyen

Taux/100 000

Taux ajusté pour 100 000 personnes

*


Attention, estimation de qualité moyenne

■

Situation comparable à celle du reste du Québec (pas de différence statistique significative)

ÉVOLUTION DANS LE TEMPS

Taux d'incidence du cancer du côlon-rectum,
Abitibi-Témiscamingue et Québec, 1986-1990 à 2006-2010



SOURCE

Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, fichier des tumeurs, 1986 à 2010. Estimations et projections démographiques.


FAITS SAILLANTS

Le cancer du côlon-rectum constitue en Abitibi-Témiscamingue la 3^e principale cause de cancer dans l'ensemble de la population. Parmi les divers facteurs de risque associés à ce cancer on retrouve l'âge, le poids, la grande consommation de viande rouge ou de viandes transformées, la consommation d'alcool, la sédentarité, le tabagisme, etc.

Au cours des 25 dernières années, le taux d'incidence du cancer du côlon-rectum a légèrement diminué au Québec tandis qu'il est demeuré relativement stable en Abitibi-Témiscamingue, fluctuant entre 74 et 71 cas pour 100 000 personnes. Pour la période 2006-2010, le taux régional s'établit à 71 cas pour 100 000 personnes, une valeur comparable à la situation québécoise. Cela équivaut à 103 nouveaux cas de cancer du côlon-rectum enregistrés en moyenne annuellement dans la région.

ÉVOLUTION DANS LE TEMPS

Taux d'incidence du cancer du côlon-rectum,
CSSS du Témiscamingue, 1986-1990 à 2006-2010



SOURCE

Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, fichier des tumeurs, 1986 à 2010. Estimations et projections démographiques.


FAITS SAILLANTS

Le cancer du côlon-rectum constitue en Abitibi-Témiscamingue la 3^e principale cause de cancer dans l'ensemble de la population. Parmi les divers facteurs de risque associés à ce cancer on retrouve l'âge, le poids, la grande consommation de viande rouge ou de viandes transformées, la consommation d'alcool, la sédentarité, le tabagisme, etc.

Dans le territoire du CSSS du Témiscamingue, le taux d'incidence du cancer du côlon-rectum s'est d'abord accru durant les années 90 puis a diminué depuis le début des années 2000. Pour la période 2006-2010, il se situe à 58 cas pour 100 000, une valeur qui ne diffère pas significativement sur le plan statistique du taux québécois qui s'élève à 70 cas pour 100 000. Dans le territoire, cela correspond à une moyenne annuelle de 10 nouveaux cas de cancer du côlon-rectum.

ÉVOLUTION DANS LE TEMPS

Taux d'incidence du cancer du côlon-rectum,
CSSS de Rouyn-Noranda, 1986-1990 à 2006-2010



SOURCE

Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, fichier des tumeurs, 1986 à 2010. Estimations et projections démographiques.


FAITS SAILLANTS

Le cancer du côlon-rectum constitue en Abitibi-Témiscamingue la 3^e principale cause de cancer dans l'ensemble de la population. Parmi les divers facteurs de risque associés à ce cancer on retrouve l'âge, le poids, la grande consommation de viande rouge ou de viandes transformées, la consommation d'alcool, la sédentarité, le tabagisme, etc.

Dans le territoire du CSSS de Rouyn-Noranda, le taux d'incidence du cancer du côlon-rectum a diminué progressivement au cours des 25 dernières années. Pour la période 2006-2010, il se situe à 68 cas pour 100 000, une valeur qui ne diffère pas significativement sur le plan statistique du taux québécois qui s'élève à 70 cas pour 100 000. Dans le territoire, cela correspond à une moyenne annuelle de 27 nouveaux cas de cancer du côlon-rectum.

ÉVOLUTION DANS LE TEMPS

Taux d'incidence du cancer du côlon-rectum,
CSSS des Aurores-Boréales, 1986-1990 à 2006-2010



SOURCE

Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, fichier des tumeurs, 1986 à 2010. Estimations et projections démographiques.


FAITS SAILLANTS

Le cancer du côlon-rectum constitue en Abitibi-Témiscamingue la 3^e principale cause de cancer dans l'ensemble de la population. Parmi les divers facteurs de risque associés à ce cancer on retrouve l'âge, le poids, la grande consommation de viande rouge ou de viandes transformées, la consommation d'alcool, la sédentarité, le tabagisme, etc.

Dans le territoire du CSSS des Aurores-Boréales, le taux d'incidence du cancer du côlon-rectum a diminué de 1986-1990 à 2001-2005. Toutefois, il a enregistré une remontée importante en 2006-2010 et se situe alors à 84 cas pour 100 000, une valeur qui ne diffère pas significativement du taux québécois sur le plan statistique. Dans le territoire, on enregistre en moyenne annuellement 20 nouveaux cas de cancer du côlon-rectum.

ÉVOLUTION DANS LE TEMPS

Taux d'incidence du cancer du côlon-rectum,
CSSS Les Eskers de l'Abitibi, 1986-1990 à 2006-2010



SOURCE

Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, fichier des tumeurs, 1986 à 2010. Estimations et projections démographiques.


FAITS SAILLANTS

Le cancer du côlon-rectum constitue en Abitibi-Témiscamingue la 3^e principale cause de cancer dans l'ensemble de la population. Parmi les divers facteurs de risque associés à ce cancer on retrouve l'âge, le poids, la grande consommation de viande rouge ou de viandes transformées, la consommation d'alcool, la sédentarité, le tabagisme, etc.

Malgré quelques fluctuations, le taux d'incidence du cancer du côlon-rectum semble avoir suivi une tendance à la baisse, au cours des 25 dernières années, dans le territoire du CSSS Les Eskers de l'Abitibi. En 2006-2010, le taux se situe à 56 cas pour 100 000 personnes, une valeur comparable à celle du Québec (69) sur le plan statistique. Dans le territoire, cela représente une moyenne annuelle de 13 nouveaux cas de cancer du côlon-rectum.

ÉVOLUTION DANS LE TEMPS

Taux d'incidence du cancer du côlon-rectum,
CSSS de La Vallée-de-l'Or, 1986-1990 à 2006-2010



SOURCE

Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, fichier des tumeurs, 1986 à 2010. Estimations et projections démographiques.

FAITS SAILLANTS

Le cancer du côlon-rectum constitue en Abitibi-Témiscamingue la 3^e principale cause de cancer dans l'ensemble de la population. Parmi les divers facteurs de risque associés à ce cancer on retrouve l'âge, le poids, la grande consommation de viande rouge ou de viandes transformées, la consommation d'alcool, la sédentarité, le tabagisme, etc.

Dans le territoire du CSSS de la Vallée-de-l'Or, malgré quelques fluctuations, le taux d'incidence du cancer du côlon-rectum s'est accru au fil des ans. En 2006-2010, il atteint 81 cas pour 100 000 personnes mais cette valeur ne diffère pas significativement du taux québécois sur le plan statistique. En 2006-2010, on enregistre en moyenne annuellement 32 nouveaux cas de cancer du côlon-rectum dans le territoire de la Vallée-de-l'Or.