

ÉTAT DE SANTÉ

SANTÉ PHYSIQUE

Prévalence de certains problèmes de santé chroniques : maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite (2015-2016)

Mise à jour Novembre 2019

DÉFINITION

Les maux de dos constituent les problèmes de santé chroniques les plus souvent rapportés par la population lors d'enquêtes de santé au Canada. Ils comprennent un vaste éventail de maladies ou de troubles tels que la scoliose, la sciatique, l'hernie discale, les blessures à la moelle épinière, aux os ou au tissu musculaire. Ils peuvent entraîner des douleurs variables et s'avérer invalidants (Agence de la santé publique du Canada, 2012).

Proportion : Nombre de personnes à domicile, âgées de 12 ans et plus, ayant reçu un diagnostic d'un professionnel de la santé pour un problème de maux de dos, autre que la fibromyalgie et l'arthrite, de longue durée (6 mois ou plus), par rapport à l'ensemble des personnes à domicile âgées de 12 ans et plus, multiplié par 100. Cette proportion est ensuite ajustée selon la méthode de standardisation directe avec la population du Québec de 2011 comme population de référence.

Nombre estimé : Nombre de personnes à domicile de 12 ans et plus ayant reçu un diagnostic d'un professionnel de la santé pour un problème de maux de dos, autre que la fibromyalgie et l'arthrite, de longue durée (6 mois ou plus). Ces estimations sont arrondies à la centaine la plus proche.

SOURCE




Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2015-2016. Traitement des données réalisé par l'Infocentre de santé publique du Québec.

NOTES


Les tests statistiques établissent une comparaison entre la région et le reste du Québec, c'est-à-dire l'ensemble du Québec excluant la région. Néanmoins, les données québécoises présentées dans le tableau se rapportent bien à l'ensemble du Québec.

Les comparaisons entre le cycle 2015-2016 de l'ESCC et tous les cycles antérieurs ne sont pas recommandées, en raison des modifications majeures dans la méthodologie de l'enquête en 2015-2016.

Prévalence des maux de dos autres que la fibromyalgie ou l'arthrite (2015-2016)


Territoires	Population de 12 ans et plus					
	Sexes réunis		Hommes		Femmes	
	% ajusté	N ^e	% ajusté	N ^e	% ajusté	N ^e
Abitibi-Témiscamingue	18 	22 100	20 	12 700	16 	9 400
Québec	17	1 239 500	17	599 000	18	640 400

N^e Nombre estimé

 Situation comparable à celle du reste du Québec (pas de différence statistique significative)

ÉVOLUTION DANS LE TEMPS

Proportion de la population âgée de 12 ans et plus souffrant de maux de dos autres que la fibromyalgie ou l'arthrite, Abitibi-Témiscamingue et Québec, 2000-2001 à 2015-2016



SOURCE

Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2000-2001, 2003, 2005, 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014 et 2015-2016. Traitement des données réalisé par l'Infocentre de santé publique du Québec.

NOTE

L'évolution des données dans le temps est fournie à titre indicatif car les méthodes de collecte ont varié selon les enquêtes. Cela a pu avoir une influence sur les réponses des individus, altérant ainsi la comparabilité des données.

FAITS SAILLANTS

De 2000-2001 à 2013-2014, la proportion de la population de 12 ans et plus souffrant de maux de dos a varié de 13 % jusqu'à 22 % dans la région. En 2015-2016, elle se situait à 18 %, un pourcentage comparable à celui du reste du Québec (17 %).