

ÉTAT DE SANTÉ

SANTÉ PHYSIQUE

**P**révalence de certains problèmes de santé chroniques : migraines (2015-2016)

Mise à jour Novembre 2019

**DÉFINITION**

Les migraines sont une sorte de maux de tête violents affectant généralement un seul côté de la tête et pouvant durer quelques heures ou quelques jours. Elles s'accompagnent souvent d'autres symptômes tels que les nausées, les vomissements, une intolérance à la lumière et au bruit, ou encore des troubles de la vision. En fonction de leur fréquence et de leur durée, elles peuvent être très invalidantes pour les personnes affectées.

Proportion : Nombre de personnes à domicile, âgées de 12 ans et plus, ayant reçu un diagnostic d'un professionnel de la santé pour un problème de migraines de longue durée (6 mois ou plus), par rapport à l'ensemble des personnes à domicile âgées de 12 ans et plus, multiplié par 100. Cette proportion est ensuite ajustée selon la méthode de standardisation directe avec la population du Québec de 2011 comme population de référence.

Nombre estimé: Nombre de personnes à domicile de 12 ans et plus ayant reçu un diagnostic d'un professionnel de la santé pour un problème de migraines de longue durée (6 mois ou plus). Ces estimations sont arrondies à la centaine la plus proche.

**SOURCE**



Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2015-2016. Traitement des données réalisé par l'Infocentre de santé publique du Québec.

**NOTES**

Les tests statistiques établissent une comparaison entre la région et le reste du Québec, c'est-à-dire l'ensemble du Québec excluant la région. Néanmoins, les données québécoises présentées dans le tableau se rapportent bien à l'ensemble du Québec.


Les comparaisons entre le cycle 2015-2016 de l'ESCC et tous les cycles antérieurs ne sont pas recommandées, en raison des modifications majeures dans la méthodologie de l'enquête en 2015-2016.

## Prévalence des migraines (2015-2016)

Territoires	Population de 12 ans et plus					
	Sexes réunis		Hommes		Femmes	
	% ajusté	N <sup>e</sup>	% ajusté	N <sup>e</sup>	% ajusté	N <sup>e</sup>
Abitibi-Témiscamingue	10 	12 200	6 *	3 700	14 	8 500
Québec	9	634 100	5	171 400	13	462 700


N<sup>e</sup> Nombre estimé

\* Attention, estimation de qualité moyenne

 Situation comparable à celle du reste du Québec (pas de différence statistique significative)

## ÉVOLUTION DANS LE TEMPS

Proportion de la population âgée de 12 ans et plus souffrant de migraines, Abitibi-Témiscamingue et Québec, 2000-2001 à 2015-2016



## SOURCE

Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2000-2001, 2003, 2005, 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014 et 2015-2016.

## NOTE

L'évolution des données dans le temps est fournie à titre indicatif car les méthodes de collecte ont varié selon les enquêtes. Cela a pu avoir une influence sur les réponses des individus, altérant ainsi la comparabilité des données.

## FAITS SAILLANTS

De 2000-2001 à 2013-2014, la proportion de personnes souffrant de migraines a varié de 7 % à 12 % en Abitibi-Témiscamingue. En 2015-2016, elle se situait à 10 %, un pourcentage comparable à celui du reste du Québec (9 %). À noter que la proportion de femmes (14 %) s'avère plus importante que celles chez les hommes (6 %) (voir le tableau de la page 2).