

ÉTAT DE SANTÉ

SANTÉ PHYSIQUE

P

révalence de certains problèmes de santé chroniques : arthrite ou arthrose (2017-2018)

Mise à jour Décembre 2020

DÉFINITION

Maladie touchant les articulations, les tissus les entourant ainsi que d'autres tissus conjonctifs, l'arthrite est plus marquée chez les personnes âgées de 65 ans et plus. Toutefois, elle ne se limite pas à cette population âgée et bon nombre de personnes dans la force de l'âge en souffrent. Elle peut prendre plusieurs formes dont l'arthrose qui est la plus répandue. L'arthrite demeure incurable et constitue une des principales causes d'incapacité physique (douleur et limitation d'activités) dans la population (Agence de la santé publique du Canada, 2010).

Proportion : Nombre de personnes à domicile, âgées de 18 ans et plus, ayant reçu un diagnostic d'un professionnel de la santé pour un problème d'arthrite ou d'arthrose de longue durée (6 mois ou plus) (excluant la fibromyalgie), par rapport à l'ensemble des personnes à domicile âgées de 18 ans et plus, multiplié par 100. Cette proportion est ensuite ajustée selon la structure par âge, avec la méthode de standardisation directe utilisant la population du Québec de 2011 comme population de référence.

Nombre estimé: Nombre de personnes à domicile de 18 ans et plus ayant reçu un diagnostic d'un professionnel de la santé pour un problème d'arthrite ou d'arthrose de longue durée (6 mois ou plus) (excluant la fibromyalgie). Ces estimations sont arrondies à la centaine la plus proche.

SOURCE




Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), 2017-2018. Traitement des données réalisé par l'Infocentre de santé publique du Québec.



NOTES

Les tests statistiques établissent une comparaison entre la région et le reste du Québec, c'est-à-dire l'ensemble du Québec excluant la région. Néanmoins, les données québécoises présentées dans le tableau se rapportent bien à l'ensemble du Québec.

Les comparaisons entre le cycle 2017-2018 de l'ESCC et tous les cycles antérieurs à 2015-2016 ne sont pas recommandées, en raison des modifications majeures dans la méthodologie de l'enquête en 2015-2016.


Prévalence de l'arthrite (2017-2018)

Territoires	Population de 18 ans et plus					
	Sexes réunis		Hommes		Femmes	
	% ajusté	N ^e	% ajusté	N ^e	% ajusté	N ^e
Abitibi-Témiscamingue	19 	22 800	16 	10 000	21 	12 800
Québec	18	1 235 200	14	461 900	21	773 100

- N^e Nombre estimé
 Situation comparable à celle du reste du Québec (pas de différence statistique significative)
 Situation plus défavorable que celle du reste du Québec (différence statistique significative)

ÉVOLUTION DANS LE TEMPS

Proportion (% ajusté) de la population âgée de 18 ans et plus souffrant d'arthrite ou d'arthrose, Abitibi-Témiscamingue et Québec, 2007-2008 à 2017-2018



SOURCE

Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), 2007-2008, 2011-2012, 2013-2014, 2015-2016 et 2017-2018. Traitement des données réalisé par l'Infocentre de santé publique du Québec.

NOTE

L'évolution des données dans le temps est fournie à titre indicatif car les méthodes de collecte ont varié selon les enquêtes. Cela a pu avoir une influence sur les réponses des individus, altérant ainsi la comparabilité des données.

FAITS SAILLANTS

La proportion de la population âgée de 18 ans et plus souffrant d'arthrite ou d'arthrose a fluctué légèrement en Abitibi-Témiscamingue de 2007-2008 à 2013-2014, passant de 13 % à 15 % puis 12 %. En 2017-2018, elle atteignait 19 %, un résultat comparable à celui du reste du Québec (18 %).