

Taux d'incidence de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)

(2022-2023)

Mise à jour : Août 2024

Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue
PORTRAIT DE SANTÉ

ÉTAT de santé



SANTÉ PHYSIQUE



DÉFINITION

La maladie pulmonaire obstructive chronique regroupe ici la bronchite chronique et l'emphysème. Causée en grande partie par le tabagisme, elle se caractérise par une obstruction progressive et partiellement réversible des voies respiratoires. Parmi les principaux symptômes, mentionnons les difficultés respiratoires, la toux persistante, la production de mucus et l'essoufflement qui s'intensifie graduellement.

Nombre : nombre de nouveaux cas de personnes atteintes de MPOC, âgées de 35 ans et plus, d'un territoire donné, enregistrés au cours d'une année financière.

Une personne assurée par le régime public d'assurance-maladie du Québec est atteinte de MPOC si elle a :

- un diagnostic (principal ou secondaire) de MPOC inscrit au fichier des hospitalisations MED-ÉCHO,
- ou un diagnostic de MPOC enregistré au fichier des services médicaux rémunérés à l'acte.

Taux pour 1 000 : Nombre de nouveaux cas de personnes atteintes de MPOC, âgées de 35 ans et plus, d'un territoire donné, enregistrés au cours d'une année financière, rapporté à la population âgée de 35 ans et plus du même territoire à la période, multiplié par 1 000. À noter que le taux est ensuite ajusté selon la méthode de standardisation directe avec la population du Québec de 2011 comme population de référence.

SOURCE



Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ), Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), année financière 2022-2023. Le traitement des données est réalisé par l'Infocentre de santé publique du Québec.

NOTES



Les tests statistiques établissent une comparaison entre la région et le reste du Québec, c'est-à-dire l'ensemble du Québec excluant la région. Néanmoins, les données québécoises présentées dans le tableau se rapportent bien à l'ensemble du Québec.

Les données du SISMACQ sous-estiment la réalité dans la MRC de Témiscamingue. En effet, elles utilisent des informations issues du fichier des services rémunérés à l'acte. Or, un certain nombre de médecins pratiquant dans ce territoire ne sont pas rémunérés à l'acte mais selon d'autres modes de rémunération. Il est également probable qu'une partie de la population aille chercher des services médicaux en Ontario, services qui ne sont pas comptabilisés dans le SISMACQ. Les résultats présentés pour la MRC de Témiscamingue doivent donc être considérés comme des minimums.



NOTES (suite)

En 2016, la RAMQ a procédé à la modernisation de son système de facturation des services médicaux rémunérés à l'acte, ce qui a entraîné une diminution de la saisie des codes de diagnostic dans ce fichier. Par conséquent, les résultats de cet indicateur doivent être interprétés avec prudence à partir de l'année financière 2016-2017. En dépit de la diminution globale de la saisie des codes de diagnostic, l'incidence de cette maladie est plus élevée entre les années financières 2016-2017 et 2019-2020. Une faible sous-estimation de l'incidence est tout de même soupçonnée à partir de l'année financière 2016-2017.

En raison de la pandémie de COVID-19, du délestage, des mesures sanitaires mises en place et des impacts collatéraux de la pandémie, à partir de l'année financière 2020-2021, les indicateurs peuvent présenter certaines limites et, par conséquent, doivent être interprétés avec prudence et contextualisés.

La somme des parties peut ne pas égaler le total en raison de l'arrondissement des nombres à un multiple de 5.


Taux d'incidence de la MPOC (2022-2023) dans la population de 35 ans et plus

Territoires	Sexes réunis		Hommes		Femmes	
	N	Taux /1 000	N	Taux /1 000	N	Taux /1 000
MRC de Témiscamingue	70	6,3	40	7,9	30	4,8*
Ville de Rouyn-Noranda	175	7,6(+)	85	7,9	85	7,5
MRC d'Abitibi-Ouest	105	8,9(+)	70	11,2(+)	45	6,9
MRC d'Abitibi	105	7,2	45	6,3	60	8,1
MRC de la Vallée-de-l'Or	315	13,1(+)	155	13,2(+)	160	13,2(+)
Abitibi-Témiscamingue	770	9,1(+)	400	9,6(+)	375	8,8(+)
Québec	32 125	6,3	15 855	6,5	16 270	6,1

N Nombre (arrondi aléatoirement à l'unité 5)
 Taux/1 000 Taux ajusté pour 1 000 personnes
 * Attention, estimation de qualité moyenne
 (+) Taux significativement plus élevé que celui du reste du Québec
 (-) Taux significativement plus faible que celui du reste du Québec

Évolution dans le temps

Taux d'incidence de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)
 parmi la population âgée de 35 ans et plus,
 Abitibi-Témiscamingue et Québec, 2001-2002 à 2022-2023



SOURCE

Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ), Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) de 2001-2002 à 2022-2023. Le traitement des données est réalisé par l'Infocentre de santé publique du Québec.


FAITS SAILLANTS



Depuis le début des années 2000, l'Abitibi-Témiscamingue a connu une diminution du taux d'incidence de la MPOC avec néanmoins quelques fluctuations. Alors que le taux s'établissait à 14,7 nouveaux cas pour 1 000 personnes en 2001-2002, il se situait en 2022-2023 à 9,1 nouveaux cas pour 1 000, en hausse depuis deux ans. Il demeurait toutefois supérieur au taux du reste du Québec (6,3). Cela correspondait à un peu moins de 800 personnes ayant reçu dans la région un nouveau diagnostic de MPOC en 2022-2023. Au Québec, la tendance est également à la baisse mais le taux se révèle moins élevé que dans la région.

Évolution dans le temps

**Taux d'incidence de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)
 parmi la population âgée de 35 ans et plus, MRC de Témiscamingue,
 2001-2002 à 2022-2023**



SOURCE

Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ), Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) de 2001-2002 à 2022-2023. Le traitement des données est réalisé par l'Infocentre de santé publique du Québec.



Évolution dans le temps

**Taux d'incidence de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)
 parmi la population âgée de 35 ans et plus, Ville de Rouyn-Noranda,
 2001-2002 à 2022-2023**



SOURCE

Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ), Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) de 2001-2002 à 2022-2023. Le traitement des données est réalisé par l'Infocentre de santé publique du Québec.



Évolution dans le temps

**Taux d'incidence de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)
 parmi la population âgée de 35 ans et plus, MRC d'Abitibi-Ouest,
 2001-2002 à 2022-2023**



SOURCE

Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ), Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) de 2001-2002 à 2022-2023. Le traitement des données est réalisé par l'Infocentre de santé publique du Québec.



Évolution dans le temps

**Taux d'incidence de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)
 parmi la population âgée de 35 ans et plus, MRC d'Abitibi,
 2001-2002 à 2022-2023**



SOURCE

Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ), Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) de 2001-2002 à 2022-2023. Le traitement des données est réalisé par l'Infocentre de santé publique du Québec.



Évolution dans le temps

Taux d'incidence de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)
 parmi la population âgée de 35 ans et plus, MRC de la Vallée-de-l'Or,
 2001-2002 à 2022-2023



SOURCE

Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ), Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) de 2001-2002 à 2022-2023. Le traitement des données est réalisé par l'Infocentre de santé publique du Québec.

