

Taux de prévalence de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) (2024-2025)

Mise à jour : Août 2026

Santé Québec Abitibi-Témiscamingue

PORTRAIT DE SANTÉ

État de santé

Santé physique

Définition



La maladie pulmonaire obstructive chronique regroupe ici la bronchite chronique et l'emphysème. Causée en grande partie par le tabagisme et la pollution de l'air, elle se caractérise par une obstruction progressive et partiellement réversible des voies respiratoires. Parmi les principaux symptômes, mentionnons les difficultés respiratoires, la toux persistante, la production de mucus et l'essoufflement qui s'intensifie graduellement.

Nombre : Nombre de personnes atteintes de MPOC, âgées de 35 ans et plus, d'un territoire donné, enregistrées au cours d'une année financière.

Une personne assurée par le régime public d'assurance-maladie du Québec est atteinte de MPOC si elle a :

- un diagnostic (principal ou secondaire) de MPOC inscrit au fichier des hospitalisations MED-ECHO,
- ou un diagnostic de MPOC enregistré au fichier des services médicaux rémunérés à l'acte.

Proportion : Nombre personnes atteintes de MPOC, âgées de 35 ans et plus, d'un territoire donné, en date d'une année financière, rapporté à la population âgée de 35 ans et plus du même territoire au milieu de la période, multiplié par 100. À noter que la proportion est ensuite ajustée selon la méthode de standardisation directe avec la population du Québec de **2021** comme population de référence.

Source

Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ), Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), année financière 2024-2025. Le traitement des données est réalisé par l'Infocentre de santé publique du Québec.

Notes



Les tests statistiques établissent une comparaison entre la région et le reste du Québec, c'est-à-dire l'ensemble du Québec excluant la région. Néanmoins, les données québécoises présentées dans le tableau se rapportent bien à l'ensemble du Québec.


Les données du SISMACQ sous-estiment la réalité dans la MRC de Témiscamingue. En effet, elles utilisent des informations issues du fichier des services rémunérés à l'acte. Or, un certain nombre de médecins pratiquant dans ce territoire ne sont pas rémunérés à l'acte mais selon d'autres modes de rémunération. Il est également probable qu'une partie de la population aille chercher des services médicaux en Ontario, services qui ne sont pas comptabilisés dans le SISMACQ. Les résultats présentés pour la MRC de Témiscamingue doivent donc être considérés comme des minimums.

La somme des parties peut ne pas évaluer le total en raison de l'arrondissement des nombres à un multiple de 5.

Taux de prévalence de la MPOC dans la population de 35 ans et plus (2024-2025)

Territoires	Sexes réunis		Hommes		Femmes	
	N	%	N	%	N	%
MRC de Témiscamingue	990	8,4(-)	530	9,1	455	7,8(-)
Ville de Rouyn-Noranda	3 590	13,2(+)	1 785	13,6(+)	1 800	12,8(+)
MRC d'Abitibi-Ouest	1 885	12,8(+)	1 005	13,7(+)	875	11,9(+)
MRC d'Abitibi	1 590	9,5	810	9,9	780	9,3
MRC de la Vallée-de-l'Or	3 515	12,8(+)	1 705	12,6(+)	1 805	13,0(+)
Abitibi-Témiscamingue	11 565	11,8(+)	5 840	12,2(+)	5 725	11,6(+)
Québec	527 690	9,3	247 570	9,3	280 115	9,4
N	Nombre (arrondi aléatoirement à l'unité 5)					
%	Pourcentage ajusté					
(+)	Taux significativement plus élevé que celui du reste du Québec					
(-)	Taux significativement plus faible que celui du reste du Québec					

Évolution dans le temps



Source

Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ), Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) de 2001-2002 à 2024-2025. Le traitement des données est réalisé par l'Infocentre de santé publique du Québec.

Note

Les taux ajustés ont été calculés avec la population du Québec 2021 comme référence. Par conséquent, il est possible qu'ils soient différents de taux présentés dans d'autres documents, pour la même période, mais calculés avec la population du Québec 2011. Toutefois, les tendances observées demeurent les mêmes.


Faits saillants



On observe une hausse du pourcentage de la population atteinte de MPOC en Abitibi-Témiscamingue, le taux ayant augmenté de 11,1 % à 13,4 % de 2001-2002 à 2014-2015. Depuis, il a connu une diminution graduelle. En 2024-2025, il s'établissait à 11,8 %. Cela représente donc dans la région près de 12 000 personnes atteintes de MPOC. La situation apparaît plus défavorable dans la région qu'ailleurs au Québec (9,3 %), le pourcentage de personnes atteintes de MPOC s'avérant significativement plus élevé.

Évolution dans le temps

Pourcentage de la population de 35 ans et plus vivant avec un diagnostic de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), MRC de Témiscamingue, Abitibi-Témiscamingue et Québec, 2001-2002 à 2024-2025




Source

Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ), Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) de 2001-2002 à 2024-2025. Le traitement des données est réalisé par l'Infocentre de santé publique du Québec.

Note

Les taux ajustés ont été calculés avec la population du Québec 2021 comme référence. Par conséquent, il est possible qu'ils soient différents de taux présentés dans d'autres documents, pour la même période, mais calculés avec la population du Québec 2011. Toutefois, les tendances observées demeurent les mêmes.

Évolution dans le temps



Source


Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ), Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) de 2001-2002 à 2024-2025. Le traitement des données est réalisé par l'Infocentre de santé publique du Québec.

Note

Les taux ajustés ont été calculés avec la population du Québec 2021 comme référence. Par conséquent, il est possible qu'ils soient différents de taux présentés dans d'autres documents, pour la même période, mais calculés avec la population du Québec 2011. Toutefois, les tendances observées demeurent les mêmes.

Évolution dans le temps

Pourcentage de la population de 35 ans et plus vivant avec un diagnostic de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), MRC d'Abitibi-Ouest, Abitibi-Témiscamingue et Québec, 2001-2002 à 2024-2025




Source

Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ), Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) de 2001-2002 à 2024-2025. Le traitement des données est réalisé par l'Infocentre de santé publique du Québec.

Note

Les taux ajustés ont été calculés avec la population du Québec 2021 comme référence. Par conséquent, il est possible qu'ils soient différents de taux présentés dans d'autres documents, pour la même période, mais calculés avec la population du Québec 2011. Toutefois, les tendances observées demeurent les mêmes.

Évolution dans le temps




Source

Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ), Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) de 2001-2002 à 2024-2025. Le traitement des données est réalisé par l'Infocentre de santé publique du Québec.

Note

Les taux ajustés ont été calculés avec la population du Québec 2021 comme référence. Par conséquent, il est possible qu'ils soient différents de taux présentés dans d'autres documents, pour la même période, mais calculés avec la population du Québec 2011. Toutefois, les tendances observées demeurent les mêmes.

Évolution dans le temps



Source

Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ), Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) de 2001-2002 à 2024-2025. Le traitement des données est réalisé par l'Infocentre de santé publique du Québec.

Note

Les taux ajustés ont été calculés avec la population du Québec 2021 comme référence. Par conséquent, il est possible qu'ils soient différents de taux présentés dans d'autres documents, pour la même période, mais calculés avec la population du Québec 2011. Toutefois, les tendances observées demeurent les mêmes.