

Taux de mortalité par tumeurs malignes

(2017-2019)

Mise à jour : Novembre 2022

Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue
PORTRAIT DE SANTÉ

ÉTAT de santé



SANTÉ PHYSIQUE

DÉFINITION

Les tumeurs malignes constituent la première cause de mortalité en Abitibi-Témiscamingue comme au Québec. Parmi les diverses tumeurs malignes responsables de décès, les plus fréquentes au Québec et dans la région sont les tumeurs malignes du poumon, du côlon-rectum et du sein.

Nombre : Nombre annuel moyen de décès par tumeurs malignes survenus chez les résidents d'un territoire donné au cours d'une période donnée.

Taux pour 100 000 : Rapport pour une période donnée du nombre annuel moyen de décès par tumeurs malignes survenus chez les résidents d'un territoire donné, à la population du territoire au milieu de la période, multiplié par 100 000. Le taux est ensuite ajusté selon la méthode de standardisation directe avec la population du Québec de 2011 comme population de référence.



SOURCE

Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, fichier des décès 2017 à 2019, estimations et projections démographiques. Traitement des données réalisé par l'Infocentre de santé publique du Québec.



NOTES

Les données du fichier fermé des décès 2013 et 2019 excluent les événements de résidents québécois survenus en Ontario. Ces décès représentent moins de 1 % de l'ensemble des décès enregistrés au Québec pour ces années. En Abitibi-Témiscamingue, cela représente également moins de 1 % de tous les décès.

Les tests statistiques établissent une comparaison entre la région et le reste du Québec, c'est-à-dire l'ensemble du Québec excluant la région. Néanmoins, les données québécoises présentées dans le tableau se rapportent bien à l'ensemble du Québec.




Taux de mortalité par tumeurs malignes (2017-2019)

Territoires	Sexes réunis		Hommes		Femmes	
	N moy/an	Taux/100 000	N moy/an	Taux/100 000	N moy/an	Taux/100 000
MRC de Témiscamingue	40	207	23	243	17	174
Ville de Rouyn-Noranda	111	241	60	284	51	211
MRC d'Abitibi-Ouest	62	248	35	284	27	217
MRC d'Abitibi	68	253	40	312 (+)	28	202
MRC de la Vallée-de-l'Or	127	287 (+)	78	367 (+)	50	217
Abitibi-Témiscamingue	408	253 (+)	236	306 (+)	172	207
Québec	21 203	226	11 070	258	10 133	201

N moy/an Nombre annuel moyen
Taux/100 000 Taux ajusté pour 100 000 personnes
(+) Taux significativement plus élevé que celui du reste du Québec
(-) Taux significativement plus faible que celui du reste du Québec

Évolution dans le temps

Taux de mortalité par tumeurs malignes, Abitibi-Témiscamingue et Québec, 1982-1984 à 1997-1999 et 2002-2004 à 2017-2019



SOURCE

Ministère de la santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1982 à 2019. Estimations et projections démographiques. Traitement des données réalisé par l'Infocentre de santé publique du Québec.

NOTE


Le passage en 2000 de la 9e révision de la Classification internationale des maladies (CIM-9) à la 10e révision occasionne la coupure de la série chronologique. Il est préférable de ne pas comparer les données postérieures à l'année 2000 à celles antérieures.

FAITS SAILLANTS

Depuis le début des années 2000, le taux de mortalité par tumeurs malignes a graduellement diminué au Québec. En Abitibi-Témiscamingue, on observe une tendance à la baisse malgré quelques fluctuations. Le taux s'établit ainsi à 253 décès par tumeurs malignes pour 100 000 personnes en 2017-2019, une valeur statistiquement plus élevée que celle du reste du Québec (226). Cela correspond à un peu plus de 400 décès par tumeurs malignes en moyenne annuellement dans la région.

Évolution dans le temps

Taux de mortalité par tumeurs malignes,
MRC de Témiscamingue, 1982-1984 à 1997-1999 et
2002-2004 à 2017-2019



SOURCE

Ministère de la santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1982 à 2019. Estimations et projections démographiques. Traitement des données réalisé par l'Infocentre de santé publique du Québec.




NOTE

Le passage en 2000 de la 9e révision de la Classification internationale des maladies (CIM-9) à la 10e révision occasionne la coupure de la série chronologique. Il est préférable de ne pas comparer les données postérieures à l'année 2000 à celles antérieures.



Évolution dans le temps

**Taux de mortalité par tumeurs malignes,
Ville de Rouyn-Noranda, 1982-1984 à 1997-1999 et
2002-2004 à 2017-2019**



SOURCE

Ministère de la santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1982 à 2019. Estimations et projections démographiques. Traitement des données réalisé par l'Infocentre de santé publique du Québec.




NOTE

Le passage en 2000 de la 9e révision de la Classification internationale des maladies (CIM-9) à la 10e révision occasionne la coupure de la série chronologique. Il est préférable de ne pas comparer les données postérieures à l'année 2000 à celles antérieures.



Évolution dans le temps

Taux de mortalité par tumeurs malignes,
MRC d'Abitibi-Ouest, 1982-1984 à 1997-1999 et
2002-2004 à 2017-2019



SOURCE

Ministère de la santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1982 à 2019. Estimations et projections démographiques. Traitement des données réalisé par l'Infocentre de santé publique du Québec.




NOTE

Le passage en 2000 de la 9e révision de la Classification internationale des maladies (CIM-9) à la 10e révision occasionne la coupure de la série chronologique. Il est préférable de ne pas comparer les données postérieures à l'année 2000 à celles antérieures.



Évolution dans le temps

Taux de mortalité par tumeurs malignes, MRC d'Abitibi, 1982-1984 à 1997-1999 et 2002-2004 à 2017-2019



SOURCE

Ministère de la santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1982 à 2019. Estimations et projections démographiques. Traitement des données réalisé par l'Infocentre de santé publique du Québec.




NOTE

Le passage en 2000 de la 9e révision de la Classification internationale des maladies (CIM-9) à la 10e révision occasionne la coupure de la série chronologique. Il est préférable de ne pas comparer les données postérieures à l'année 2000 à celles antérieures.



Évolution dans le temps

Taux de mortalité par tumeurs malignes,
MRC de la Vallée-de-l'Or, 1982-1984 à 1997-1999 et
2002-2004 à 2017-2019



SOURCE

Ministère de la santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1982 à 2019. Estimations et projections démographiques. Traitement des données réalisé par l'Infocentre de santé publique du Québec.



NOTE

Le passage en 2000 de la 9e révision de la Classification internationale des maladies (CIM-9) à la 10e révision occasionne la coupure de la série chronologique. Il est préférable de ne pas comparer les données postérieures à l'année 2000 à celles antérieures.

