

PIQ-Info

ANNONCE

1. LE PIQ NOUVEAU LANCÉ AU PRINTEMPS 2018

La nouvelle édition du PIQ sera lancée au mois de mai 2018. Une tournée régionale a été organisée afin d'informer rapidement toutes les vaccinatrices de la région sur les modalités d'utilisation de cette édition entièrement en ligne. L'occasion sera saisie de présenter les modifications au Programme québécois d'immunisation, modifications applicables au printemps 2018 ou dans un avenir proche.

Les sessions d'une journée, de 9 h à 16 h, se tiendront dans 5 villes de la région. Le calendrier qui suit a été élaboré avec les chefs de service en santé publique. Nous invitons les vaccinatrices de Malartic, Senneterre et Témiscaming, ainsi que celles des communautés autochtones et des milieux privés à se rendre à l'endroit de leur choix. Il n'est pas nécessaire de s'inscrire.

Date	Établissement	Salle
Vendredi 4 mai 2018 9 h à 16 h	UQAT 445 boul. de l'Université Rouyn-Noranda	Salle D-400
Jeudi 10 mai 2018 9 h à 16 h	Hôpital Ville-Marie Pavillon Sainte-Famille 22, rue Notre-Dame Nord Ville-Marie	Salle Pierre-Larouche
Lundi 14 mai 2018 9 h à 16 h	UQAT 675 1 ^{re} Avenue Val-d'Or	Local 4224
Mercredi 16 mai 2018 9 h à 16 h	CLSC d'Amos 632, 1 ^{re} Rue Ouest Amos	Salle administrative 230
Jeudi 17 mai 2018 9 h à 16 h	Hôpital La Sarre 679, 2 ^e Rue Est La Sarre	Salle Paul Fortin 4 ^e étage Salle Sommet 1et 2

Les personnes qui possèdent un appareil mobile (portable, tablette, cellulaire) pourront explorer la nouvelle plate-forme du PIQ dans les salles dotées d'un accès WIFI, ce qui est le cas à l'UQAT. Cependant, l'accès ne sera peut-être pas disponible dans toutes les autres salles.

Il est important de préciser qu'il n'est pas obligatoire d'avoir en sa possession un appareil électronique pour suivre la formation. Il y aura une présentation à l'écran.

Une demande d'accréditation sera faite à l'UQAT pour 5 h 30 de formation.

Au plaisir de vous rencontrer!

2. FORMATION EN SANTÉ VOYAGE

Nous vous rappelons la tenue de la formation biennale en santé-voyage, tel qu'annoncé au mois de février. Cette rencontre sera l'occasion de présenter les nouveautés, de développer et maintenir nos compétences en santé-voyage à l'aide d'exercices pratiques et d'échanges.

Voici les coordonnées de cette rencontre.

DATE	Vendredi 8 juin 2018
ENDROIT	Local C-300 Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 445, boulevard de l'Université, Rouyn-Noranda
FORMATRICE	Dre Yen-Giang Bui
HEURE	De 9 h à 16 h

Le programme de la journée ainsi que la fiche d'inscription vous seront transmis ultérieurement. Nous vous invitons à nous soumettre vos questions ou sujets. Vos suggestions sont bienvenues!

Aussi, une demande d'accréditation sera faite à l'UQAT pour 5 h 30 de formation.

ACTUALITÉS

➤ VACCINATION PRÉSCOLAIRE ET HÉPATITE B

Rappelons que le programme de vaccination des nourrissons contre l'hépatite B a débuté en juin 2013 et visait les enfants nés depuis le 1^{er} avril 2013. Afin que tous les enfants du Québec puissent bénéficier d'une protection contre cette infection, le programme de vaccination contre l'hépatite B des enfants de la 4^e année du primaire est maintenu jusqu'à l'arrivée des cohortes de nourrissons ayant reçu le vaccin hexavalent DCaT-HB-VPI-Hib. Voir le document [Questions et réponses à l'intention des professionnels de la santé](#).

Les enfants qui entreront à la maternelle au cours de l'année scolaire 2018-2019 sont presque tous nés entre le 1^{er} octobre 2012 et le 30 septembre 2013. La moitié de cette cohorte fait partie de la première ciblée par le programme de vaccination des nourrissons. L'autre moitié est née avant le 1^{er} avril 2013 : le programme de vaccination précise que ces enfants seront vaccinés en 4^e année du primaire. Il y aura donc maintien du programme de vaccination dans 5 ans pour ces enfants.

Au moment de vérifier les antécédents de vaccination des enfants qui entreront à l'école en septembre 2018, il n'est pas recommandé de débiter une vaccination contre l'hépatite B (2 doses à 5 mois d'intervalle), puisque ces enfants pourront être vaccinés en 4^e année du primaire. De plus, le vaccin monovalent contre l'hépatite B se fait rare présentement.

À celles qui se préoccupent que la majorité des autres enfants nés depuis le 1^{er} avril 2013 ont reçu l'hexavalent et ne sont donc pas protégés contre l'hépatite A, sachez que le CIQ réfléchit à la meilleure

manière d'inclure le vaccin contre l'hépatite A dans le Programme québécois d'immunisation. On a constaté des bénéfices de la protection additionnelle contre l'hépatite A utilisé dans le programme de vaccination contre l'hépatite B

VACCIN ZONA-SU ET ANTÉCÉDENTS DE VACCINATION

L'arrivée sur le marché du vaccin zona-SU (Shingrix) suscite de l'engouement et des questionnements!

Voici quelques points sur ce vaccin. Le sujet sera discuté plus longuement au cours de la tournée régionale.

1- Avis sur la pertinence d'ajouter la vaccination contre le zona dans le Programme québécois d'immunisation

Cet avis du CIQ est attendu avec beaucoup d'impatience et il devrait être diffusé sous peu. Des éléments de l'avis préliminaire comprennent la recommandation unanime des membres du CIQ de mettre sur pied un programme de vaccination contre le zona. Les personnes susceptibles de bénéficier de ce programme sont celles âgées de 50 ans et plus, en particulier les personnes immunodéprimées. Des limites financières empêchent d'offrir le vaccin gratuitement à toutes ces personnes. Il faudra prioriser! C'est le MSSS qui tranchera. Une décision sera annoncée dans quelques mois.

Le vaccin zona-SU doit être utilisé de façon préférentielle compte tenu de son efficacité optimale et de la possibilité de l'administrer aux personnes immunodéprimées.

2- Personnes ayant déjà reçu le vaccin zona-VA (Zostavax)

Le vaccin vivant atténué contre le zona était le seul disponible avant 2018. Il a déjà été administré à plusieurs personnes.

L'efficacité de ce vaccin diminue avec l'âge à la vaccination, l'état de santé et le temps écoulé depuis la vaccination. Il est impossible de prédire à quel moment une personne n'est plus protégée contre le zona.

Dans son avis préliminaire, le CIQ recommande d'attendre **un an** avant de donner Shingrix à une personne ayant déjà reçu Zostavax. Ce délai remplace celui de 6 mois qu'on trouve actuellement dans le PIQ. Le délai d'un an sera précisé dans la prochaine édition du PIQ.

3- Personnes ayant déjà eu un épisode de zona

Un épisode de zona est dû à la réactivation du virus de la varicelle : il entraîne une réponse du système immunitaire qui se traduit par une augmentation des anticorps contre la varicelle. Une récurrence du zona est possible et varie selon l'âge de la personne, son état de santé et le temps écoulé depuis l'épisode de zona. Il est impossible de prédire à quel moment une personne pourrait connaître une récurrence de zona.

Dans son avis préliminaire, le CIQ recommande d'attendre **un an** avant de donner Shingrix à une personne ayant déjà eu un épisode de zona.

➤ SAISON GRIPPALE 2017-2018 ET EFFICACITÉ VACCINALE

La présente saison grippale se distingue des précédentes par son intensité et par la circulation simultanée des virus de type A(H3N2) et B.

Soulignons que l'efficacité du vaccin de cette année est loin d'être optimale pour protéger contre l'un des virus circulants, l'influenza A(H3N2). En janvier dernier, l'efficacité à prévenir les consultations due à la grippe A(H3N2) a été évaluée à 17 %.

En ce qui concerne l'efficacité mesurée pour le virus de type B, elle a été estimée à 55 %, malgré le fait que la souche prédominante ne soit pas couverte par le vaccin trivalent. Par contre, elle est visée par le vaccin

quadrivalent administré aux enfants. Les experts avancent que la protection croisée contre les virus de type B peut expliquer cette performance acceptable même avec le vaccin trivalent.

Signe que la situation s'améliore, la fin de l'offre systématique du vaccin contre la grippe vient d'être annoncée. Toutefois, vu que le virus de la grippe B est encore actif et que le vaccin offre une certaine protection contre cette souche, il est recommandé de poursuivre la vaccination pour les personnes qui risquent davantage de souffrir de complications liées à la grippe B :

- les bébés âgés de 6 à 23 mois;
- les personnes âgées de 2 à 17 ans ayant des conditions à risque de complication liée à la grippe
- les nouvelles admissions en hébergement de soins de longue durée.

Pour en savoir davantage et pour suivre le déclin attendu de l'activité grippale, voir le [site du MSSS](#) et les [bulletins Flash grippe](#).

LE SAVIEZ-VOUS ?

➤ LE BUTYLCAOUTCHOUC EST UN LATEX SYNTHÉTIQUE

La question se pose lorsque la vaccinatrice se trouve face à une personne ayant une allergie grave, de type anaphylactique, au latex.

Rappelons que les vaccins et les immunoglobulines ne contiennent pas de latex naturel ni de latex synthétique. Toutefois, les bouchons des fioles ainsi que les pistons et les capuchons des seringues, incluant ceux des vaccins oraux, peuvent en contenir.

Le latex naturel contient des protéines végétales naturelles qui seraient la cause de l'allergie au latex. La dermatite de contact représente la majorité des allergies au latex naturel. Il s'agit d'une réaction d'hypersensibilité retardée. Dans ce contexte, on peut administrer un vaccin fourni dans un contenant comprenant du latex naturel. Cependant, il serait contre-indiqué de l'administrer à une personne ayant une allergie grave au latex.

Pour sa part, le latex synthétique, tel que le butylcaoutchouc, ne contient aucune substance naturelle et, par conséquent, n'entraîne aucune allergie au latex. À noter qu'au cours des dernières années, les fabricants ont eu tendance à retirer le latex naturel de leurs contenants. Plusieurs monographies précisent l'absence de latex, tandis que d'autres (ex. : Rotarix, Infanrix hexa, Infanrix-IPV-Hib, Synflorix, Shingrix) mentionnent la présence de butylcaoutchouc.

- Responsable en immunisation : M^{me} Isabelle Kirouac, isabelle_kirouac1@ssss.gouv.qc.ca
- Médecin-conseil : D^{re} Nicole Bouchard, nbouchar@ssss.gouv.qc.ca

Téléphone: 819 764-3264 Télécopieur : 819 764-4537

Centre intégré
de santé et de services
sociaux de l'Abitibi-
Témiscamingue

Québec 