

## AIDE-MÉMOIRE

### Calendrier régulier de vaccination

### Visite additionnelle à l'âge de 6 mois

Condition médicale	Vaccins		
	DCaT-VPI-Hib	Pneu-C 10	Pneu-C-20
• Prématurité (< 32 semaines)	√	√	
• Petit poids de naissance (< 1 500 g)	√	√	
• Asplénie anatomique	√		√ <sup>(1)</sup>
• Asplénie fonctionnelle	√		√ <sup>(1)</sup>
• État d'immunodépression	√		√ <sup>(1)</sup>
• Implant cochléaire	√	√	
• Maladie pulmonaire (ex : dysplasie bronchopulmonaire) • Maladie cardiaque (ex. : cardiopathie cyanogène) • Maladie hépatique • Diabète • Insuffisance rénale ou syndrome néphrotique • Écoulement chronique de LCR • Condition médicale pouvant compromettre l'évacuation des sécrétions respiratoires et augmenter les risques d'aspiration • Membre vivant dans les communautés autochtones du Nunavik et des Terres-Cries-de-la-Baie-James		√	

(1) Si la vaccination a été amorcée avec le vaccin Pneu-C-10, poursuivre avec le vaccin Pneu-C-20.

#### À retenir :

- < 5 ans : calendrier mixte Pneu-C-10/Pneu-C-13. À partir d'un an, vacciner avec le Pneu-C-13.
- Vacciner avec le Pneu-C-20 à 2, 4, 6 mois et 1 an, les nourrissons avec asplénie anatomique ou fonctionnelle ou un état d'immunodépression. Si la vaccination a été débutée avec un vaccin Pneu-C-10, Pneu-C-13 ou Pneu-C-15, vous devez poursuivre la série avec le vaccin Pneu-C-20.
- Une dose du vaccin Pneu-C-20 doit être administrée aux personnes avec asplénie anatomique ou fonctionnelle ou immunodéprimée qui ont complété leur vaccination avec Pneu-C-10, Pneu-C-13 ou Pneu-C-15.