

AIDE-MÉMOIRE SUR LA VACCINATION CONTRE LES BACTÉRIES ENCAPSULÉES CHEZ LES PERSONNES ASPLÉNIQUES OU À RISQUE D'ASPLÉNIE FONCTIONNELLE

Vaccination spécifique contre *Hæmophilus influenzae* de type b, méningocoque et pneumocoque

Vaccins ⁽¹⁾	1 ^{re} visite	6 mois après 1 ^{re} visite	Rappel
Hib ⁽²⁾	√		
Men-B ⁽³⁾	√	√	Aux 5 ans ⁽⁴⁾
Men-C-ACYW135	√		Aux 5 ans ⁽⁴⁾
Pneu-C-20 ⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾	√		

Notes

- (1) Les personnes à risque d'asplénie fonctionnelle, immunodéprimées en raison d'un traitement ou d'une autre condition médicale, devraient aussi recevoir le vaccin contre l'hépatite B (double posologie) ainsi que le vaccin contre le zona. À noter que l'asplénie en soi n'est pas une condition amenant une immunodépression.
- (2) Seulement si non vacciné avant l'âge de 5 ans.
- (3) Pour l'enfant âgé de moins de 1 an, voir le calendrier spécifique dans la section Men-B du PIQ.
- (4) La dose de rappel avec le vaccin Men-B et Men-C-ACYW est recommandée tous les trois ans si un vaccin a été reçu à l'âge de six ans ou moins, et tous les cinq ans si un vaccin a été reçu à l'âge de sept ans ou plus.
- (5) Si la personne a déjà reçu un vaccin Pneu-C ou Pneu-P, attendre 1 an avant d'administrer le vaccin Pneu-C-20. Chez les jeunes enfants qui viennent de terminer leur série vaccinale avec un Pneu-C et qui n'ont pas reçu le vaccin Pneu-P, l'intervalle recommandé est de 8 semaines entre la dernière dose de Pneu-C et le vaccin Pneu-C-20.
- (6) Vacciner avec Pneu-C-20 pour toute la série vaccinale à 2, 4, 6 mois et 1 an, les nourrissons avec asplénie anatomique ou fonctionnelle ou un état d'immunodépression. Si la vaccination a été débutée avec un autre vaccin Pneu-C, poursuivre avec le vaccin Pneu-C-20.
- (7) Si le Pneu-C-20 a été administré, le vaccin Pneu-P n'est alors pas requis à la suite.