

CONSIGNES POUR LA PRISE EN CHARGE DES CRISES D'ASTHME

Un enfant asthmatique présente l'un ou l'autre des symptômes suivants

- Toux continue
- Difficulté à respirer
- Serrement à la poitrine (sifflement dans la poitrine)
- L'enfant peut aussi paraître agité, irritable ou très fatigué.

IL FAUT AGIR!

Administrez immédiatement une dose de médicament avec l'inhalateur à action rapide (pompe). 1 dose = 2 inhalations. Utilisez le tube d'espacement (aérochambre) si fourni.

- Respiration difficile rapide
- Incapacité à parler en phrases complètes
- Couleur bleue des lèvres ou des doigts
- Tirage de la peau entre les côtes ou à la base du cou
- L'enfant peut également paraître anxieux, désorienté et très fatigué

IL S'AGIT D'UNE URGENCE!

Attendez 10 minutes et revérifiez les symptômes.

Si les symptômes s'atténuent

Attendez la disparition des symptômes pour que l'enfant reprenne ses activités normales

Avisez les parents selon les modalités convenues

S'il y a aggravation des symptômes ou qu'aucun soulagement n'est observé.

IL S'AGIT D'UNE URGENCE!

Administrez une **dose** avec l'inhalateur de soulagement (pompe), 1 dose = 2 inhalations. Utilisez le tube d'espacement (aérochambre) si fourni.

Composez le 911 pour demander une ambulance et suivez les consignes suivantes jusqu'à l'arrivée des secours :

Attendez 15 minutes.

Si les symptômes persistent, utilisez la pompe pour administrer une **dose** à toutes les 15 minutes en attendant les secours.

Ne pas administrer plus de 4 doses au total.

En attendant les secours :

Parler calmement à l'élève tout en le rassurant.

Incitez-le à respirer lentement et profondément.

Communiquez avec les parents ou les personnes à aviser en cas d'urgence