

Démystifier la 2^e dose de rappel (4^e dose)


La 4^e dose, c'est pour qui?

Les personnes visées, à risque élevé de complications :

- Les résidents en CHSLD, en RPA et d'autres milieux d'hébergement collectifs pour aînées;
- Personnes âgées de 80 ans et plus qui vivent dans la communauté;
- Personnes immunodéprimées ou dialysées âgées de 12 ans et plus.

Risque modéré :

Les personnes âgées de **60 à 79 ans** qui vivent dans la communauté sont à risque modéré de complications et d'hospitalisations ainsi ils pourraient aussi bénéficier d'une 2^e dose de rappel.



Pourquoi recevoir une 2^e dose de rappel :

- Elle fournit une protection supplémentaire contre une maladie grave chez les personnes plus à risque;
- Elle diminue le risque d'hospitalisation et de décès suite à une infection de COVID-19.



Veillez noter que la 2^e dose de rappel n'est pas indiquée pour les personnes visées qui ont fait la COVID-19 depuis janvier.

Est-ce que les personnes de moins de 60 ans doivent recevoir une 2^e dose de rappel ?

Les personnes plus jeunes :

- Présentent un faible risque de maladies graves lié à la COVID-19 nécessitant une hospitalisation;
- Les données montrent que la protection offerte par 3 doses du vaccin chez ces personnes est excellente et durable.

À l'heure actuelle, les données ne démontrent pas un avantage d'une 2^e dose de rappel pour les personnes âgées de **18 à 59 ans**.

Il est donc préférable d'attendre avant de recevoir une 4^e dose du vaccin. Toutefois, si vous le souhaitez, il est possible de prendre rendez-vous pour la recevoir.

À l'heure actuelle, les données ne démontrent pas un avantage d'une 2^e dose de rappel pour les personnes âgées de 18 à 59 ans. Il est donc préférable d'attendre avant de recevoir une 4^e dose du vaccin. Toutefois, si vous le souhaitez, il est possible de prendre rendez-vous pour la recevoir.

Puis-je contracter la COVID-19 après avoir reçu ma dose de rappel ?

Omicron et ses sous-variants sont capables d'échapper à l'immunité, ainsi les vaccins sont un peu moins efficaces pour prévenir l'infection de COVID-19.

De ce fait, une personne qui a reçu 3 ou 4 doses du vaccin peut contracter la COVID-19. Cependant, le risque de maladie grave ou d'hospitalisation sera beaucoup plus faible.



Centre intégré
de santé et de services
sociaux de l'Abitibi-
Témiscamingue

Québec 